

**THE
VICE-COUNTY DISTRIBUTION AND ATLAS
OF THE
HEMIPTERA-HETEROPTERA
OF THE
BRITISH ISLES**

by

Robert Ryan, BA(Hons), BSc(Hons), DPhil, FLS, FRES

38 St John Street, Oxford, UK, OX12LH

RobRyanBugs@gmail.com

Interim Release

© May 2026, Robert Ryan

[Page intentionally left blank.]

TABLE 1. The codes and names of the vice-counties of the British Isles.

1	West Cornwall with Scilly	52	Anglesey	103	Mid Ebudes
2	East Cornwall	53	South Lincolnshire	104	North Ebudes
3	South Devon	54	North Lincolnshire	105	West Ross & Cromarty
4	North Devon	55	Leicestershire with Rutland	106	East Ross & Cromarty
5	South Somerset	56	Nottinghamshire	107	East Sutherland
6	North Somerset	57	Derbyshire	108	West Sutherland
7	North Wiltshire	58	Cheshire	109	Caithness
8	South Wiltshire	59	South Lancashire	110	Outer Hebrides
9	Dorset	60	West Lancashire	111	Orkney
10	Isle of Wight	61	South-east Yorkshire	112	Shetland
11	South Hampshire	62	North-east Yorkshire	H1	South Kerry
12	North Hampshire	63	South-west Yorkshire	H2	North Kerry
13	West Sussex	64	Mid-west Yorkshire	H3	West Cork
14	East Sussex	65	North-west Yorkshire	H4	Mid-Cork
15	East Kent	66	County Durham	H5	East Cork
16	West Kent	67	South Northumberland	H6	Waterford
17	Surrey	68	North Northumberland	H7	South Tipperary
18	South Essex	69	Westmorland with Furness	H8	Limerick
19	North Essex	70	Cumberland	H9	Clare
20	Hertfordshire	71	Isle of Man	H10	North Tipperary
21	Middlesex	72	Dumfriesshire	H11	Kilkenny
22	Berkshire	73	Kirkcudbrightshire	H12	Wexford
23	Oxfordshire	74	Wigtownshire	H13	Carlow
24	Buckinghamshire	75	Ayrshire	H14	Laois
25	East Suffolk	76	Renfrewshire	H15	South-east Galway
26	West Suffolk	77	Lanarkshire	H16	West Galway
27	East Norfolk	78	Peebleshire	H17	North-east Galway
28	West Norfolk	79	Selkirkshire	H18	Offaly
29	Cambridgeshire	80	Roxburghshire	H19	Kildare
30	Bedfordshire	81	Berwickshire	H20	Wicklow
31	Huntingdonshire	82	East Lothian	H21	Dublin
32	Northamptonshire	83	Midlothian	H22	Meath
33	East Gloucestershire	84	West Lothian	H23	Westmeath
34	West Gloucestershire	85	Fifeshire	H24	Longford
35	Monmouthshire	86	Stirlingshire	H25	Roscommon
36	Herefordshire	87	West Perthshire	H26	East Mayo
37	Worcestershire	88	Mid Perthshire	H27	West Mayo
38	Warwickshire	89	East Perthshire	H28	Sligo
39	Staffordshire	90	Angus	H29	Leitrim
40	Shropshire	91	Kincardineshire	H30	Cavan
41	Glamorganshire	92	South Aberdeenshire	H31	Louth
42	Breconshire	93	North Aberdeenshire	H32	Monaghan
43	Radnorshire	94	Banffshire	H33	Fermanagh
44	Carmarthenshire	95	Moray	H34	East Donegal
45	Pembrokeshire	96	East Inverness-shire	H35	West Donegal
46	Cardiganshire	97	West Inverness-shire	H36	Tyrone
47	Montgomeryshire	98	Argyllshire	H37	Armagh
48	Merionethshire	99	Dunbartonshire	H38	Down
49	Caernarvonshire	100	Clyde Isles	H39	Antrim
50	Denbighshire	101	Kintyre	H40	Londonderry
51	Flintshire	102	South Ebudes		




FIGURE 1. A map of the vice-counties of the British Isles with codes.

TABLE 2. The number of species recorded for each of the vice-counties of the British Isles.

Surrey	480	Monmouthshire	251	North-east Galway	93
East Kent	460	Cardiganshire	234	Sligo	93
East Sussex	450	Herefordshire	233	Dunbartonshire	91
Berkshire	445	Westmorland with Furness	233	South-east Galway	91
West Kent	442	Anglesey	230	Kildare	91
South Hampshire	428	East Inverness-shire	224	Roscommon	91
Oxfordshire	425	Denbighshire	212	East Donegal	90
West Sussex	424	County Durham	211	Lanarkshire	88
Bedfordshire	418	South Wiltshire	206	Tyrone	88
Dorset	410	Merionethshire	198	East Lothian	87
West Norfolk	406	South Somerset	192	West Sutherland	86
Cambridgeshire	400	Mid Perthshire	190	Westmeath	83
Hertfordshire	397	North Devon	189	Outer Hebrides	79
East Norfolk	392	North-west Yorkshire	187	West Inverness-shire	78
South Essex	390	Moray	184	West Donegal	77
South-west Yorkshire	384	South Northumberland	183	Isle of Man	74
Buckinghamshire	378	Dublin	182	Carlow	74
Middlesex	365	Down	179	Leitrim	73
East Suffolk	361	North Kerry	178	South Tipperary	72
North Hampshire	359	East Ross & Cromarty	170	Limerick	68
Huntingdonshire	357	Wicklow	167	Kilkenny	68
Northamptonshire	354	Armagh	166	Angus	67
Warwickshire	344	North Wiltshire	165	Renfrewshire	66
Glamorganshire	344	Dumfriesshire	162	Clyde Isles	60
South Devon	342	South Kerry	159	Mid-Cork	60
West Suffolk	341	Clare	156	West Lothian	59
South-east Yorkshire	341	Waterford	153	Orkney	56
Cheshire	337	South Aberdeenshire	151	Wigtownshire	54
Isle of Wight	334	Antrim	150	Roxburghshire	54
Shropshire	325	Wexford	147	Monaghan	54
North Lincolnshire	324	East Perthshire	143	West Perthshire	52
North Essex	313	Fifeshire	142	Meath	52
West Cornwall with Scilly	311	North Northumberland	138	East Mayo	52
North-east Yorkshire	311	Breconshire	136	Kincardineshire	50
East Gloucestershire	307	Fermanagh	132	South Ebudes	49
Worcestershire	288	West Cork	130	Peebleshire	48
Cumberland	287	West Ross & Cromarty	128	Louth	48
West Gloucestershire	286	West Galway	128	Argyllshire	46
Staffordshire	285	West Mayo	127	Cavan	43
Derbyshire	285	North Ebudes	122	Offaly	41
Mid-west Yorkshire	279	Flintshire	118	Mid Ebudes	40
South Lancashire	275	Kirkcudbrightshire	118	Caithness	40
North Somerset	272	Radnorshire	117	North Tipperary	38
East Cornwall	270	Montgomeryshire	116	Selkirkshire	36
Caernarvonshire	269	Midlothian	112	North Aberdeenshire	36
South Lincolnshire	268	Berwickshire	109	Laois	35
Nottinghamshire	263	East Sutherland	105	Longford	35
Carmarthenshire	259	Ayrshire	103	Kintyre	31
West Lancashire	257	Londonderry	100	Banffshire	30
Leicestershire with Rutland	256	East Cork	97	Shetland	28
Pembrokeshire	255	Stirlingshire	94	TOTAL	28805




FIGURE 2. A map of the species richness of the vice-counties of the British Isles. The data of Table 2 are plotted with vice-county polygons filled by a greyscale in proportion to the number of recorded species, darkest for the highest and lightest for the lowest.

TABLE 3. The number of vice-counties recorded for each of the species of the British Isles.

<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus (Notonectidae)	148	<i>Corixa panzeri</i> Fieber (Corixidae)	100
<i>Sigara dorsalis</i> (Leach) (Corixidae)	147	<i>Micronecta poweri</i> (Douglas & Scott) (Corixidae)	100
<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus) (Anthocoridae)	144	<i>Asciodema obsoleta</i> (Fieber) (Miridae)	98
<i>Callicorixa praeusta</i> (Fieber) (Corixidae)	144	<i>Cylloceria hystrix</i> (Linnaeus) (Miridae)	98
<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus) (Gerridae)	143	<i>Harpocera thoracica</i> (Fallén) (Miridae)	98
<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus (Nepidae)	142	<i>Lygocoris rugicollis</i> (Fallén) (Miridae)	98
<i>Sigara distincta</i> (Fieber) (Corixidae)	142	<i>Rhabdomiris striatellus</i> (Fabricius) (Miridae)	98
<i>Velia caprai</i> Tamanini (Veliidae)	139	<i>Orthotylus ericetorum</i> (Fallén) (Miridae)	97
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber) (Corixidae)	139	<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter (Lygaeidae)	96
<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	138	<i>Nabis ferus</i> (Linnaeus) (Nabidae)	96
<i>Corixa punctata</i> (Illiger) (Corixidae)	138	<i>Calocoris roseomaculatus</i> (De Geer) (Miridae)	96
<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus) (Acanthosomatidae)	137	<i>Phytocoris longipennis</i> Flor (Miridae)	96
<i>Nabis limbatus</i> Dahlbom (Nabidae)	136	<i>Phytocoris tiliae</i> (Fabricius) (Miridae)	96
<i>Sigara falleni</i> (Fieber) (Corixidae)	136	<i>Psallus ambiguus</i> (Fallén) (Miridae)	96
<i>Sigara nigrolineata</i> (Fieber) (Corixidae)	136	<i>Temnostethus gracilis</i> Horváth (Anthocoridae)	94
<i>Stenodema calcarata</i> (Fallén) (Miridae)	135	<i>Dicyphus stachydis</i> J. Sahlberg (Miridae)	94
<i>Plagiognathus arbustorum</i> (Fabricius) (Miridae)	132	<i>Phylus melanocephalus</i> (Linnaeus) (Miridae)	94
<i>Pithanus maerkelii</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	131	<i>Salda littoralis</i> (Linnaeus) (Saldidae)	94
<i>Saldula saltatoria</i> (Linnaeus) (Saldidae)	131	<i>Teratocoris saundersi</i> Douglas & Scott (Miridae)	93
<i>Capsus ater</i> (Linnaeus) (Miridae)	130	<i>Nabis ericetorum</i> Scholtz (Nabidae)	92
<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin) (Miridae)	130	<i>Dicyphus epilobii</i> Reuter (Miridae)	92
<i>Gerris odontogaster</i> (Zetterstedt) (Gerridae)	129	<i>Orthops campestris</i> (Linnaeus) (Miridae)	92
<i>Gerris thoracicus</i> Schummel (Gerridae)	129	<i>Acalypta parvula</i> (Fallén) (Tingidae)	91
<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (Wolff) (Miridae)	128	<i>Apolygus lucorum</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	91
<i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius) (Anthocoridae)	126	<i>Gastroles grossipes</i> (De Geer) (Lygaeidae)	90
<i>Nabis flavomarginatus</i> Scholtz (Nabidae)	125	<i>Bryocoris pteridis</i> (Fallén) (Miridae)	90
<i>Lygocoris pabulinus</i> (Linnaeus) (Miridae)	125	<i>Neolygus viridis</i> (Fallén) (Miridae)	90
<i>Hesperocorixa linnaei</i> (Fieber) (Corixidae)	125	<i>Saldula orthochila</i> (Fieber) (Saldidae)	89
<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus) (Miridae)	124	<i>Hebrus ruficeps</i> Thomson (Hebridae)	89
<i>Mecomma ambulans</i> (Fallén) (Miridae)	124	<i>Sigara venusta</i> (Douglas & Scott) (Corixidae)	89
<i>Elasmotethus interstinctus</i> (Linnaeus) (Acanthosomatidae)	123	<i>Drymus brunneus</i> (R.F. Sahlberg) (Lygaeidae)	87
<i>Stenodema laevigata</i> (Linnaeus) (Miridae)	123	<i>Heterocordylus tibialis</i> (Hahn) (Miridae)	87
<i>Sigara fossarum</i> (Leach) (Corixidae)	123	<i>Gerris lateralis</i> Schummel (Gerridae)	87
<i>Stenodema holsata</i> (Fabricius) (Miridae)	122	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze) (Miridae)	86
<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister) (Veliidae)	122	<i>Heterotoma planicornis</i> (Pallas) (Miridae)	86
<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius) (Pentatomidae)	121	<i>Malacocoris chlorizans</i> (Panzer) (Miridae)	86
<i>Sigara lateralis</i> (Leach) (Corixidae)	121	<i>Pantilius tunicatus</i> (Fabricius) (Miridae)	86
<i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	120	<i>Plea minutissima</i> Leach (Pleidae)	86
<i>Chartoscirta cincta</i> (Herrich-Schaeffer) (Saldidae)	120	<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer) (Lygaeidae)	85
<i>Leptopterna ferrugata</i> (Fallén) (Miridae)	119	<i>Stygnocoris fuliginosus</i> (Geoffroy) (Lygaeidae)	85
<i>Cymatium bonndorffii</i> (C.R. Sahlberg) (Corixidae)	119	<i>Dicyphus pallicornis</i> (Fieber) (Miridae)	85
<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus) (Hydrometridae)	118	<i>Scolopostethus affinis</i> (Schilling) (Lygaeidae)	83
<i>Stygnocoris sabulosus</i> (Schilling) (Lygaeidae)	117	<i>Acomporis pygmaeus</i> (Fallén) (Anthocoridae)	82
<i>Blepharidopterus angulatus</i> (Fallén) (Miridae)	117	<i>Loricula elegantula</i> (Baerensprung) (Microphysidae)	82
<i>Monalocoris filicis</i> (Linnaeus) (Miridae)	116	<i>Phytocoris varipes</i> Boheman (Miridae)	82
<i>Grypocoris stysi</i> (Wagner) (Miridae)	115	<i>Apolygus spinolae</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	81
<i>Tingis cardui</i> (Linnaeus) (Tingidae)	114	<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. Costa) (Nabidae)	80
<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius) (Miridae)	114	<i>Miris striatus</i> (Linnaeus) (Miridae)	80
<i>Lygus rugulipennis</i> Poppus (Miridae)	113	<i>Himacerus major</i> (A. Costa) (Nabidae)	79
<i>Pinalitus cervinus</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	113	<i>Orthotylus virescens</i> (Douglas & Scott) (Miridae)	79
<i>Anthocoris confusus</i> Reuter (Anthocoridae)	111	<i>Phytocoris ulmi</i> (Linnaeus) (Miridae)	79
<i>Arctocoris germari</i> (Fieber) (Corixidae)	111	<i>Psallus falleni</i> Reuter (Miridae)	79
<i>Orthotylus marginalis</i> Reuter (Miridae)	110	<i>Psallus lepidus</i> Fieber (Miridae)	79
<i>Hesperocorixa castanea</i> (Thomson) (Corixidae)	110	<i>Gerris argentatus</i> Schummel (Gerridae)	79
<i>Elasmucha grisea</i> (Linnaeus) (Acanthosomatidae)	108	<i>Chilacis typhae</i> (Perris) (Lygaeidae)	78
<i>Cymus glandicolor</i> Hahn (Lygaeidae)	108	<i>Orthocephalus saltator</i> (Hahn) (Miridae)	78
<i>Scolopostethus decoratus</i> (Hahn) (Lygaeidae)	108	<i>Phylus coryli</i> (Linnaeus) (Miridae)	78
<i>Paracoris concinna</i> (Fieber) (Corixidae)	107	<i>Cyphostethus tristriatus</i> (Fabricius) (Acanthosomatidae)	77
<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	106	<i>Stygnocoris rusticus</i> (Fallén) (Lygaeidae)	77
<i>Troilus luridus</i> (Fabricius) (Pentatomidae)	106	<i>Empicoris vagabundus</i> (Linnaeus) (Reduviidae)	77
<i>Neolygus contaminatus</i> (Fallén) (Miridae)	106	<i>Velia saulii</i> Tamanini (Veliidae)	77
<i>Notonecta obliqua</i> Thunberg (Notonectidae)	106	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann (Coreidae)	76
<i>Sigara scotti</i> (Douglas & Scott) (Corixidae)	106	<i>Charagochilus gyllenhalii</i> (Fallén) (Miridae)	76
<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	105	<i>Aquarius najas</i> (De Geer) (Gerridae)	76
<i>Cyrtorhinus caricus</i> (Fallén) (Miridae)	104	<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy) (Miridae)	75
<i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	103	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus) (Coreidae)	72
<i>Psallus haematodes</i> (Gmelin) (Miridae)	103	<i>Dicyphus errans</i> (Wolff) (Miridae)	72
<i>Sigara semistriata</i> (Fieber) (Corixidae)	103	<i>Dryophilocoris flavoquadrimaculatus</i> (De Geer) (Miridae)	72
<i>Stenotus binotatus</i> (Fabricius) (Miridae)	102	<i>Trigonotylus ruficornis</i> (Geoffroy) (Miridae)	72
<i>Nabis rugosus</i> (Linnaeus) (Nabidae)	101	<i>Notonecta viridis</i> Delcourt (Notonectidae)	72
<i>Psallus varians</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	101	<i>Callicorixa wollastoni</i> (Douglas & Scott) (Corixidae)	72
<i>Corixa dentipes</i> Thomson (Corixidae)	101	<i>Rhacognathus punctatus</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	71
<i>Drymus sylvaticus</i> (Fabricius) (Lygaeidae)	100	<i>Metatropis rufescens</i> (Herrich-Schaeffer) (Berytidae)	71
<i>Campyloneura virgula</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	100	<i>Compisdolon salicellum</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	71
<i>Aphelocheirus aestivalis</i> (Fabricius) (Aphelocheiridae)	100	<i>Macrosaldula scotica</i> (Curtis) (Saldidae)	71

TABLE 3 (CONTINUED).

<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius) (Anthocoridae)	70	<i>Kalama tricornis</i> (Schrank) (Tingidae)	53
<i>Orthotylus ochrotrichus</i> Fieber (Miridae)	70	<i>Anthocoris sarothamni</i> Douglas & Scott (Anthocoridae)	53
<i>Loricula pselaphiformis</i> Curtis (Microphysidae)	69	<i>Megaloceroea recticornis</i> (Geoffroy) (Miridae)	53
<i>Polymerus palustris</i> (Reuter) (Miridae)	69	<i>Ischnodemus sabuleti</i> (Fallén) (Lygaeidae)	52
<i>Gerris costae</i> (Herrich-Schaeffer) (Gerridae)	69	<i>Megacoelum infusum</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	52
<i>Sigara limitata</i> (Fieber) (Corixidae)	69	<i>Orthotylus bilineatus</i> (Fallén) (Miridae)	52
<i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy) (Scutelleridae)	68	<i>Phoenicocoris obscurellus</i> (Fallén) (Miridae)	52
<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus) (Rhopalidae)	68	<i>Saldula c-album</i> (Fieber) (Saldidae)	52
<i>Berytinus minor</i> (Herrich-Schaeffer) (Berytidae)	68	<i>Eysarcoris venustissimus</i> (Schrank) (Pentatomidae)	51
<i>Derephysia foliacea</i> (Fallén) (Tingidae)	68	<i>Physatocheila dumetorum</i> (Herrich-Schaeffer) Aggregate (Tingidae)	51
<i>Dicyphus globulifer</i> (Fallén) (Miridae)	68	<i>Himacerus apterus</i> (Fabricius) (Nabidae)	51
<i>Lygus wagneri</i> Remane (Miridae)	68	<i>Deraeocoris flavilinea</i> (A. Costa) (Miridae)	51
<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C.R. Sahlberg) (Miridae)	68	<i>Orthops basalis</i> (A. Costa) (Miridae)	51
<i>Phytocoris populi</i> (Linnaeus) (Miridae)	68	<i>Platycranus bicolor</i> (Douglas & Scott) (Miridae)	51
<i>Notonecta maculata</i> Fabricius (Notonectidae)	68	<i>Polymerus unifasciatus</i> (Fabricius) (Miridae)	51
<i>Gerris gibbifer</i> Schummel (Gerridae)	67	<i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy) (Cydnidae)	50
<i>Heterogaster urticae</i> (Fabricius) (Lygaeidae)	66	<i>Plinthisus brevipennis</i> (Latreille) (Lygaeidae)	50
<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus) (Naucoridae)	66	<i>Loricula exilis</i> (Fallén) (Microphysidae)	50
<i>Hesperocorixa moesta</i> (Fieber) (Corixidae)	66	<i>Atractotomus mali</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	50
<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén) (Rhopalidae)	65	<i>Closterotomus fulvomaculatus</i> (De Geer) (Miridae)	50
<i>Dictyla convergens</i> (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)	65	<i>Mecomma dispar</i> (Boheman) (Miridae)	50
<i>Lopus decolor</i> (Fallén) (Miridae)	65	<i>Psallus flavellus</i> Stichel (Miridae)	50
<i>Berytinus signoreti</i> (Fieber) (Berytidae)	64	<i>Orius vicinus</i> (Ribaut) (Anthocoridae)	49
<i>Deraeocoris lutescens</i> (Schilling) (Miridae)	64	<i>Camptozygum aequale</i> (Villers) (Miridae)	49
<i>Polymerus nigrata</i> (Fallén) (Miridae)	64	<i>Oncotylus viridiflavus</i> (Goeze) (Miridae)	49
<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus) (Nepidae)	64	<i>Pachytomella parallela</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	49
<i>Atractotomus magnicornis</i> (Fallén) (Miridae)	63	<i>Sthenarus rotermundi</i> (Scholtz) (Miridae)	49
<i>Aradus depressus</i> (Fabricius) (Aradidae)	62	<i>Saldula palustris</i> (Douglas) (Saldidae)	49
<i>Kleidocerys ericae</i> (Horváth) (Lygaeidae)	62	<i>Sehirus luctuosus</i> Mulsant & Rey (Cydnidae)	48
<i>Pachybrachius fracticolis</i> (Schilling) (Lygaeidae)	62	<i>Berytinus montivagus</i> (Meyer-Dür) (Berytidae)	48
<i>Lygus maritimus</i> Wagner (Miridae)	62	<i>Amblytulus nasutus</i> (Kirschbaum) (Miridae)	48
<i>Psallus salicis</i> (Kirschbaum) (Miridae)	62	<i>Cryptostemma alienum</i> Herrich-Schaeffer (Dipsocoridae)	48
<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	61	<i>Scolopostethus grandis</i> Horváth (Lygaeidae)	47
<i>Nysius thymi</i> (Wolff) (Lygaeidae)	61	<i>Trapezonotus desertus</i> Seidenstücker (Lygaeidae)	47
<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus) (Miridae)	61	<i>Chlamydatus saltitans</i> (Fallén) (Miridae)	47
<i>Orthotylus tenellus</i> (Fallén) (Miridae)	61	<i>Dicyphus constrictus</i> (Boheman) (Miridae)	47
<i>Sigara stagnalis</i> (Leach) (Corixidae)	61	<i>Orthotylus nassatus</i> (Fabricius) (Miridae)	47
<i>Coriomeris denticulatus</i> (Scopoli) (Coreidae)	60	<i>Phytocoris reuteri</i> Saunders (Miridae)	47
<i>Drymus ryeii</i> Douglas & Scott (Lygaeidae)	60	<i>Scolopostethus puberulus</i> Horváth (Lygaeidae)	46
<i>Xylocoris cursitans</i> (Fallén) (Anthocoridae)	60	<i>Micronecta scholtzi</i> (Fieber) (Corixidae)	46
<i>Macrotylus paykullii</i> (Fallén) (Miridae)	60	<i>Podops inunctus</i> (Fabricius) (Pentatomidae)	45
<i>Phytocoris dimidiatus</i> Kirschbaum (Miridae)	60	<i>Empicoris culiciformis</i> (De Geer) (Reduviidae)	45
<i>Psallus perrisi</i> (Mulsant & Rey) (Miridae)	60	<i>Xylocoris galactinus</i> (Fieber) (Anthocoridae)	45
<i>Cymus melanocephalus</i> Fieber (Lygaeidae)	59	<i>Acetropis gimmerthalii</i> (Flor) (Miridae)	45
<i>Gampsocoris punctipes</i> (Germar) (Berytidae)	59	<i>Chlamydatus pullus</i> (Reuter) (Miridae)	45
<i>Parapiesma quadratum</i> (Fieber) (Piesmatidae)	59	<i>Globiceps flavomaculatus</i> (Fabricius) (Miridae)	45
<i>Tingis ampliata</i> (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)	59	<i>Megalocoleus tanacetii</i> (Fallén) (Miridae)	45
<i>Tytthus pygmaeus</i> (Zetterstedt) (Miridae)	59	<i>Orthotylus adenocarpi</i> (Perris) (Miridae)	45
<i>Rhopalus subrufus</i> (Gmelin) (Rhopalidae)	58	<i>Orthotylus flavinervis</i> (Kirschbaum) (Miridae)	45
<i>Peritrechus lundii</i> (Gmelin) (Lygaeidae)	58	<i>Mesovelia furcata</i> Mulsant & Rey (Mesoveliidae)	45
<i>Dictyonota strichnocera</i> Fieber (Tingidae)	58	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	44
<i>Dichroscytus rufipennis</i> (Fallén) (Miridae)	58	<i>Neottiglossa pusilla</i> (Gmelin) (Pentatomidae)	44
<i>Tritomegas bicolor</i> (Linnaeus) (Cydnidae)	57	<i>Agramma laetum</i> (Fallén) (Tingidae)	44
<i>Acalypta carinata</i> (Panzer) (Tingidae)	57	<i>Heterocordylus genistae</i> (Scopoli) (Miridae)	44
<i>Orius majusculus</i> (Reuter) (Anthocoridae)	57	<i>Orthops kalmii</i> (Linnaeus) (Miridae)	44
<i>Tetraphleps bicuspis</i> (Herrich-Schaeffer) (Anthocoridae)	57	<i>Saldula opacula</i> (Zetterstedt) (Saldidae)	44
<i>Cymus claviculus</i> (Fallén) (Lygaeidae)	56	<i>Corixa affinis</i> Leach (Corixidae)	44
<i>Peritrechus geniculatus</i> (Hahn) (Lygaeidae)	56	<i>Thyreocoris scarabaeoides</i> (Linnaeus) (Thyreocoridae)	43
<i>Taphropeltus contractus</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	56	<i>Anthocoris gallarumulmi</i> (De Geer) (Anthocoridae)	43
<i>Orius niger</i> (Wolff) (Anthocoridae)	56	<i>Orthocephalus coriaceus</i> (Fabricius) (Miridae)	43
<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus (Cimicidae)	56	<i>Orthotylus viridinervis</i> (Kirschbaum) (Miridae)	43
<i>Dicyphus annulatus</i> (Wolff) (Miridae)	56	<i>Trigonotylus caelestialium</i> (Kirkaldy) (Miridae)	43
<i>Megalocoleus molliculus</i> (Fallén) (Miridae)	56	<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus) (Miridae)	42
<i>Orthonotus rufifrons</i> (Fallén) (Miridae)	56	<i>Buchananella continua</i> (F.B. White) (Anthocoridae)	41
<i>Cymatita coleoprata</i> (Fabricius) (Corixidae)	56	<i>Cardiastethus fasciventris</i> (Garbiglietti) (Anthocoridae)	41
<i>Macrodera microptera</i> (Curtis) (Lygaeidae)	55	<i>Blepharidopterus diaphanus</i> (Kirschbaum) (Miridae)	41
<i>Nysius ericae</i> (Schilling) (Lygaeidae)	55	<i>Ceratocombus coleopratus</i> (Zetterstedt) (Ceratocombidae)	41
<i>Nabis lineatus</i> Dahlbom (Nabidae)	55	<i>Chorosoma schillingii</i> (Schilling) (Rhopalidae)	40
<i>Orius laevigatus</i> (Fieber) (Anthocoridae)	55	<i>Liorhyssus hyalinus</i> (Fabricius) (Rhopalidae)	40
<i>Pinalitus rubricatus</i> (Fallén) (Miridae)	55	<i>Megalonotus dilatatus</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	40
<i>Chartoscirta cocksii</i> (Curtis) (Saldidae)	55	<i>Anthocoris simulans</i> Reuter (Anthocoridae)	40
<i>Lamproplax picea</i> (Flor) (Lygaeidae)	54	<i>Calocoris alpestris</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	40
<i>Temnostethus pusillus</i> (Herrich-Schaeffer) (Anthocoridae)	54	<i>Psallus confusus</i> Rieger (Miridae)	40
<i>Megalonotus chiragra</i> (Fabricius) (Lygaeidae)	53	<i>Salicarus roseri</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	40
<i>Piesma maculatum</i> (Laporte) (Piesmatidae)	53	<i>Neides tipularius</i> (Linnaeus) (Berytidae)	39

TABLE 3 (CONTINUED).

<i>Acalypta brunnea</i> (Germar) (Tingidae)	39	<i>Tupiocoris rhododendri</i> (Dolling) (Miridae)	28
<i>Hoplomachus thunbergii</i> (Fallén) (Miridae)	39	<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus) (Lygaeidae)	27
<i>Pilophorus perplexus</i> Douglas & Scott (Miridae)	39	<i>Berytinus clavipes</i> (Fabricius) (Berytidae)	27
<i>Arctocoris carinata</i> (C.R. Sahlberg) (Corixidae)	39	<i>Catoplatus fabricii</i> (Stål) (Tingidae)	27
<i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus) (Reduviidae)	38	<i>Dichroscytus gustavi</i> Josifov (Miridae)	27
<i>Europiella artemisiae</i> (Becker) (Miridae)	38	<i>Psallus variabilis</i> (Fallén) (Miridae)	27
<i>Hallodapus rufescens</i> (Burmeister) (Miridae)	38	<i>Trapezonotus dispar</i> Stål (Lygaeidae)	26
<i>Pseudoloxops coccineus</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	38	<i>Oeciacus hirundinis</i> (Lamarck) (Cimicidae)	25
<i>Alydus calcaratus</i> (Linnaeus) (Alydidae)	37	<i>Chlamydatus wilkinsoni</i> (Douglas & Scott) (Miridae)	25
<i>Acompocoris alpinus</i> Reuter (Anthocoridae)	37	<i>Saldula pilosella</i> (Thomson) (Saldidae)	25
<i>Loricula distinguenda</i> (Reuter) (Microphysidae)	37	<i>Limnopus rufoscutellatus</i> (Latreille) (Gerridae)	25
<i>Capsodes gothicus</i> (Linnaeus) (Miridae)	37	<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli) (Stenocephalidae)	24
<i>Macrotylus solitarius</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	37	<i>Drymus latus</i> Douglas & Scott (Lygaeidae)	24
<i>Orthotylus prasinus</i> (Fallén) (Miridae)	37	<i>Gastrodes abietum</i> Bergroth (Lygaeidae)	24
<i>Pilophorus cinnamopteris</i> (Kirschbaum) (Miridae)	37	<i>Lasiosomus enervis</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	24
<i>Teratocoris antennatus</i> (Boheman) (Miridae)	37	<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius) (Miridae)	24
<i>Tinicephalus hortulanus</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	37	<i>Closterotomus trivialis</i> (A. Costa) (Miridae)	24
<i>Gonocerus acuteangulatus</i> (Goeze) (Coreidae)	36	<i>Teratocoris viridis</i> Douglas & Scott (Miridae)	24
<i>Alloeotomus gothicus</i> (Fallén) (Miridae)	36	<i>Sigara selecta</i> (Fieber) (Corixidae)	24
<i>Psallus wagneri</i> Ossiannilsson (Miridae)	36	<i>Ischnocoris angustulus</i> (Boheman) (Lygaeidae)	23
<i>Strongylocoris leucocephalus</i> (Linnaeus) (Miridae)	36	<i>Metopoplax ditomoides</i> (A. Costa) (Lygaeidae)	23
<i>Stictopleurus punctatonevovosus</i> (Goeze) (Rhopalidae)	35	<i>Tingis reticulata</i> Herrich-Schaeffer (Tingidae)	23
<i>Nysius huttoni</i> F.B. White (Lygaeidae)	35	<i>Anthocoris visci</i> Douglas (Anthocoridae)	23
<i>Berytinus crassipes</i> (Herrich-Schaeffer) (Berytidae)	35	<i>Capsus wagneri</i> (Remane) (Miridae)	23
<i>Himacerus boops</i> (Schmidt) (Nabidae)	35	<i>Conostethus griseus</i> Douglas & Scott (Miridae)	23
<i>Chlamydatus evanescens</i> (Boheman) (Miridae)	35	<i>Psallus montanus</i> Josifov (Miridae)	23
<i>Miridius quadrivirgatus</i> (A. Costa) (Miridae)	35	<i>Trigonotylus psammaecolor</i> Reuter (Miridae)	23
<i>Pilophorus clavatus</i> (Linnaeus) (Miridae)	35	<i>Dicranocephalus medius</i> (Mulsant & Rey) (Stenocephalidae)	22
<i>Salda muelleri</i> (Gmelin) (Saldidae)	35	<i>Drymus pumilio</i> Puton (Lygaeidae)	22
<i>Aneurus avenius</i> (Dufour) (Aradidae)	34	<i>Agnocoris reclairei</i> (Wagner) (Miridae)	22
<i>Syromastus rhombeus</i> (Linnaeus) (Coreidae)	34	<i>Conostethus roseus</i> (Fallén) (Miridae)	22
<i>Nysius senecionis</i> (Schilling) (Lygaeidae)	34	<i>Halticus luteicollis</i> (Panzer) (Miridae)	22
<i>Trapezonotus arenarius</i> (Linnaeus) (Lygaeidae)	34	<i>Orthotylus moncreaffi</i> (Douglas & Scott) (Miridae)	22
<i>Dufouriellus ater</i> (Dufour) (Anthocoridae)	34	<i>Psallodema fieberi</i> (Fieber) (Miridae)	22
<i>Macrolophus rubi</i> Woodroffe (Miridae)	34	<i>Psallus luridus</i> Reuter (Miridae)	22
<i>Chartoscirta elegantula</i> (Fallén) (Saldidae)	34	<i>Hebrus pusillus</i> (Fallén) (Hebridae)	22
<i>Halosalda lateralis</i> (Fallén) (Saldidae)	34	<i>Dictyonota fuliginosa</i> A. Costa (Tingidae)	21
<i>Salda morio</i> Zetterstedt (Saldidae)	34	<i>Brachyarthrum limitatum</i> Fieber (Miridae)	21
<i>Microvelia pygmaea</i> (Dufour) (Veliidae)	34	<i>Legnotus picipes</i> (Fallén) (Cydnidae)	20
<i>Ceraleptus lividus</i> Stein (Coreidae)	33	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus) (Pyrrhocoridae)	20
<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling (Rhopalidae)	33	<i>Scolopostethus pictus</i> (Schilling) (Lygaeidae)	20
<i>Megalonotus emarginatus</i> (Rey) (Lygaeidae)	33	<i>Anthocoris butleri</i> Le Quesne (Anthocoridae)	20
<i>Megalonotus praetextatus</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	33	<i>Bothynotus pilosus</i> (Boheman) (Miridae)	20
<i>Orsillus depressus</i> (Mulsant & Rey) (Lygaeidae)	33	<i>Campylomma annulicorne</i> (Signoret) (Miridae)	20
<i>Peritrechus nubilus</i> (Fallén) (Lygaeidae)	33	<i>Parapsallus vitellinus</i> (Scholtz) (Miridae)	20
<i>Campylosteira verna</i> (Fallén) (Tingidae)	33	<i>Systellonotus triguttatus</i> (Linnaeus) (Miridae)	20
<i>Anthocoris limbatus</i> Fieber (Anthocoridae)	33	<i>Tytthus pubescens</i> (Knight) (Miridae)	20
<i>Orius laticollis</i> (Reuter) (Anthocoridae)	33	<i>Megalonotus sabulicola</i> (Thomson) (Lygaeidae)	19
<i>Saldula pallipes</i> (Fabricius) (Saldidae)	33	<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze) (Lygaeidae)	19
<i>Aneurus laevis</i> (Fabricius) (Aradidae)	32	<i>Berytinus hirticornis</i> (Brullé) (Berytidae)	19
<i>Deraeocoris scutellaris</i> (Fabricius) (Miridae)	32	<i>Stephanitis takeyai</i> Drake & Ma (Tingidae)	19
<i>Phytocoris pini</i> Kirschbaum (Miridae)	32	<i>Campylomma verbasci</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	19
<i>Aquarius paludum</i> (Fabricius) (Gerridae)	32	<i>Pachycoleus waltli</i> Fieber (Dipsocoridae)	19
<i>Adomerus biguttatus</i> (Linnaeus) (Cydnidae)	31	<i>Aepophilus bonnairei</i> Signoret (Aepophilidae)	19
<i>Acompus rufipes</i> (Wolff) (Lygaeidae)	31	<i>Glaenocoris propinqua</i> (Fieber) (Corixidae)	19
<i>Megalonotus antennatus</i> (Schilling) (Lygaeidae)	31	<i>Bathysolen nubilus</i> (Fallén) (Coreidae)	18
<i>Cimex pipistrelli</i> Jenyns (Cimicidae)	31	<i>Arocatus roeselii</i> Schilling Aggregate (Lygaeidae)	18
<i>Atractotomus parvulus</i> Reuter (Miridae)	31	<i>Acalypta nigrina</i> (Fallén) (Tingidae)	18
<i>Fieberocapsus flaveolus</i> (Reuter) (Miridae)	31	<i>Coranus subapterus</i> (De Geer) (Reduviidae)	18
<i>Plesiodema pinetella</i> (Zetterstedt) (Miridae)	31	<i>Deraeocoris olivaceus</i> (Fabricius) (Miridae)	18
<i>Eremocoris podagricus</i> (Fabricius) (Lygaeidae)	30	<i>Hypseloecus visci</i> (Puton) (Miridae)	18
<i>Graptopeltus lynceus</i> (Fabricius) (Lygaeidae)	30	<i>Megacoelum beckeri</i> (Fieber) (Miridae)	18
<i>Halticus apterus</i> (Linnaeus) (Miridae)	30	<i>Psallus betuleti</i> (Fallén) (Miridae)	18
<i>Macrolophus pygmaeus</i> (Rambur) (Miridae)	30	<i>Sigara iactans</i> Jansson (Corixidae)	18
<i>Psallus mollis</i> (Mulsant & Rey) (Miridae)	30	<i>Enoplops scapha</i> (Fabricius) (Coreidae)	17
<i>Stephanitis rhododendri</i> Horváth (Tingidae)	29	<i>Adelphocoris ticinensis</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	17
<i>Elatophilus nigricornis</i> (Zetterstedt) (Anthocoridae)	29	<i>Amblytulus brevicollis</i> Fieber (Miridae)	17
<i>Globiceps fulvicollis</i> Jakovlev (Miridae)	29	<i>Dicyphus escalerae</i> Lindberg (Miridae)	17
<i>Orthotylus concolor</i> (Kirschbaum) (Miridae)	29	<i>Macrotylus horvathi</i> (Reuter) (Miridae)	17
<i>Psallus assimilis</i> Stichel (Miridae)	29	<i>Stenodema trispinosa</i> Reuter (Miridae)	17
<i>Arenocoris fallenii</i> (Schilling) (Coreidae)	28	<i>Sigara fallenoidea</i> (Hungerford) (Corixidae)	17
<i>Stictopleurus abutylon</i> (Rossi) (Rhopalidae)	28	<i>Odontoscelis lineola</i> Rambur (Scutelleridae)	16
<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus) (Lygaeidae)	28	<i>Peribalus strictus</i> (Fabricius) (Pentatomidae)	16
<i>Neolygus populi</i> (Leston) (Miridae)	28	<i>Spathocera dalmanii</i> (Schilling) (Coreidae)	16
<i>Pinalitus viscosa</i> (Puton) (Miridae)	28	<i>Rhopalus maculatus</i> (Fieber) (Rhopalidae)	16

TABLE 3 (CONTINUED).

<i>Heterogaster artemisiae</i> Schilling (Lygaeidae)	16	<i>Conostethus venustus</i> (Fieber) (Miridae)	8
<i>Nysius graminicola</i> (Kolenati) (Lygaeidae)	16	<i>Dicyphus bolivari</i> Lindberg (Miridae)	8
<i>Nabis pseudoferus</i> Remane (Nabidae)	16	<i>Orthotylus virens</i> (Fallén) (Miridae)	8
<i>Anthocoris minki</i> Dohrn (Anthocoridae)	16	<i>Placochilus seladonicus</i> (Fallén) (Miridae)	8
<i>Dicyphus pallidus</i> (Herrich-Schaeffer) (Miridae)	16	<i>Micronecta griseola</i> Horváth (Corixidae)	8
<i>Globiceps juniperi</i> Reuter (Miridae)	16	<i>Sigara striata</i> (Linnaeus) (Corixidae)	8
<i>Chiloxanthus pilosus</i> (Fallén) (Saldidae)	16	<i>Chlorochroa juniperina</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	7
<i>Micronecta minutissima</i> (Linnaeus) (Corixidae)	16	<i>Arenocoris waltlii</i> (Herrich-Schaeffer) (Coreidae)	7
<i>Tropistethus holosericus</i> (Scholtz) (Lygaeidae)	15	<i>Henestaris halophilus</i> (Burmeister) (Lygaeidae)	7
<i>Brachysteles parvicornis</i> (A. Costa) (Anthocoridae)	15	<i>Nysius cymoides</i> (Spinola) (Lygaeidae)	7
<i>Loricula coleoprata</i> (Fallén) (Microphysidae)	15	<i>Nysius helveticus</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	7
<i>Monosynamma sabulicola</i> (Wagner) (Miridae)	15	<i>Orthotylus caprai</i> Wagner (Miridae)	7
<i>Psallus albicinctus</i> (Kirschbaum) (Miridae)	15	<i>Orthotylus junipericola</i> Linnavuori (Miridae)	7
<i>Canthophorus impressus</i> (Horváth) (Cydnidae)	14	<i>Phytocoris insignis</i> Reuter (Miridae)	7
<i>Brachycarenum tigrinus</i> (Schilling) (Rhopalidae)	14	<i>Pinalitus atomarius</i> (Meyer-Dür) (Miridae)	7
<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli) (Lygaeidae)	14	<i>Micracanthia marginalis</i> (Fallén) (Saldidae)	7
<i>Drymus pilicornis</i> (Mulsant & Rey) (Lygaeidae)	14	<i>Hydrometra gracilentia</i> Horváth (Hydrometridae)	7
<i>Eremocoris plebejus</i> (Fallén) (Lygaeidae)	14	<i>Aradus betulae</i> (Linnaeus) (Aradidae)	6
<i>Henestaris laticeps</i> (Curtis) (Lygaeidae)	14	<i>Cymus aurescens</i> Distant (Lygaeidae)	6
<i>Rhyarochromus vulgaris</i> (Schilling) (Lygaeidae)	14	<i>Notochilus limbatus</i> Fieber (Lygaeidae)	6
<i>Psallus quercus</i> (Kirschbaum) (Miridae)	14	<i>Ortholomus punctipennis</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	6
<i>Eurydema dominulus</i> (Scopoli) (Pentatomidae)	13	<i>Empicoris rubromaculatus</i> (Blackburn) (Reduviidae)	6
<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	13	<i>Orthotylus fuscescens</i> (Kirschbaum) (Miridae)	6
<i>Rhopalus rufus</i> Schilling (Rhopalidae)	13	<i>Psallus pardalis</i> Seidenstücker (Miridae)	6
<i>Empicoris baerensprungi</i> (Dohrn) (Reduviidae)	13	<i>Glaenocoris cavifrons</i> (Thomson) (Corixidae)	6
<i>Capsodes flavomarginatus</i> (Donovan) (Miridae)	13	<i>Dyoderes umbraculatus</i> (Fabricius) (Pentatomidae)	5
<i>Chlamydatus pulicarius</i> (Fallén) (Miridae)	13	<i>Halymorpha halys</i> (Stål) (Pentatomidae)	5
<i>Notostira erratica</i> (Linnaeus) (Miridae)	13	<i>Acompus pallipes</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	5
<i>Orthotylus rubidus</i> (Puton) (Miridae)	13	<i>Eremocoris abietis</i> (Linnaeus) (Lygaeidae)	5
<i>Teloleuca pellucens</i> (Fabricius) (Saldidae)	13	<i>Sphracanthus nebulosus</i> (Fallén) (Lygaeidae)	5
<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus) (Scutelleridae)	12	<i>Tingis angustata</i> (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)	5
<i>Sciocoris cursitans</i> (Fabricius) (Pentatomidae)	12	<i>Temnostethus tibialis</i> Reuter (Anthocoridae)	5
<i>Emblethis denticollis</i> Horváth (Lygaeidae)	12	<i>Xylocoris formicetorum</i> (Boheman) (Anthocoridae)	5
<i>Physatocheila smreczynskii</i> China (Tingidae)	12	<i>Aradus aterrimus</i> Fieber (Aradidae)	4
<i>Nabis brevis</i> Scholtz (Nabidae)	12	<i>Aradus corticalis</i> (Linnaeus) (Aradidae)	4
<i>Tuponia mixticolor</i> (A. Costa) (Miridae)	12	<i>Elasmucha ferrugata</i> (Fabricius) (Acanthosomatidae)	4
<i>Corixa iberica</i> Jansson (Corixidae)	12	<i>Geotomus punctulatus</i> (A. Costa) (Cydnidae)	4
<i>Drymus pilipes</i> Fieber (Lygaeidae)	11	<i>Macroplax preyssleri</i> (Fieber) (Lygaeidae)	4
<i>Coranus woodroffei</i> P.V. Putshkov (Reduviidae)	11	<i>Peritrechus convivus</i> (Stål) (Lygaeidae)	4
<i>Conostethus brevis</i> Reuter (Miridae)	11	<i>Pionosomus varius</i> (Wolff) (Lygaeidae)	4
<i>Europiella decolor</i> (Uhler) (Miridae)	11	<i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius) (Lygaeidae)	4
<i>Lygus punctatus</i> (Zetterstedt) (Miridae)	11	<i>Prostemma guttula</i> (Fabricius) (Nabidae)	4
<i>Myrmecoris gracilis</i> (R.F. Sahlberg) (Miridae)	11	<i>Orius horvathi</i> (Reuter) (Anthocoridae)	4
<i>Reuteria marqueti</i> Puton (Miridae)	11	<i>Xylocoris flavipes</i> Reuter (Anthocoridae)	4
<i>Saldula arenicola</i> (Scholtz) (Saldidae)	11	<i>Psallus lucanicus</i> Wagner (Miridae)	4
<i>Saldula fucicola</i> (J. Sahlberg) (Saldidae)	11	<i>Cymatia rogenhoferi</i> (Fieber) (Corixidae)	4
<i>Aradus cinnamomeus</i> Panzer (Aradidae)	10	<i>Mecidea lindbergi</i> Wagner (Pentatomidae)	3
<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	10	<i>Sciocoris homalonotus</i> Fieber (Pentatomidae)	3
<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda) (Pentatomidae)	10	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus) Aggregate (Lygaeidae)	3
<i>Eremocoris fenestratus</i> (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)	10	<i>Oxycarenus modestus</i> (Fallén) (Lygaeidae)	3
<i>Oncochila simplex</i> (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)	10	<i>Lasiacantha capucina</i> (Germar) (Tingidae)	3
<i>Anthocoris amplicollis</i> Horváth (Anthocoridae)	10	<i>Pygolampis bidentata</i> (Goeze) (Reduviidae)	3
<i>Xylocoridea brevipennis</i> Reuter (Anthocoridae)	10	<i>Adelphocoris quadripunctatus</i> (Fabricius) (Miridae)	3
<i>Capsodes sulcatus</i> (Fieber) (Miridae)	10	<i>Charagochilus weberi</i> Wagner (Miridae)	3
<i>Hallodapus montandoni</i> Reuter (Miridae)	10	<i>Monosynamma bohemanii</i> (Fallén) (Miridae)	3
<i>Psallus anaemicus</i> Seidenstücker (Miridae)	10	<i>Psallus pseudoplatani</i> Reichling (Miridae)	3
<i>Teratocoris caricis</i> Kirkaldy (Miridae)	10	<i>Tuponia brevirostris</i> Reuter (Miridae)	3
<i>Carpocoris purpureipennis</i> (De Geer) Aggregate (Pentatomidae)	9	<i>Zygimus nigriceps</i> (Fallén) (Miridae)	3
<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli) (Pentatomidae)	9	<i>Microvelia buenoi</i> Drake (Veliidae)	3
<i>Metopoplax fuscinervis</i> Stål (Lygaeidae)	9	<i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy) (Plataspidae)	2
<i>Amblytulus delicatus</i> (Perris) (Miridae)	9	<i>Graphosoma italicum</i> (Müller) (Pentatomidae)	2
<i>Brachynotocoris puncticornis</i> Reuter (Miridae)	9	<i>Dicranocephalus albipes</i> (Fabricius) (Stenocephalidae)	2
<i>Halticus saltator</i> (Geoffroy) (Miridae)	9	<i>Emblethis griseus</i> (Wolff) (Lygaeidae)	2
<i>Psallus helenae</i> Josifov (Miridae)	9	<i>Ischnodemus quadratus</i> Fieber (Lygaeidae)	2
<i>Strongylocoris luridus</i> (Fallén) (Miridae)	9	<i>Coranus aethiops</i> Jakovlev (Reduviidae)	2
<i>Tuponia hippophaes</i> (Fieber) (Miridae)	9	<i>Anthocoris pilosus</i> (Jakovlev) (Anthocoridae)	2
<i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Rambur) (Cydnidae)	8	<i>Alloetomus germanicus</i> Wagner (Miridae)	2
<i>Odontoscels fuliginosa</i> (Linnaeus) (Scutelleridae)	8	<i>Halticus macrocephalus</i> Fieber (Miridae)	2
<i>Pachybrachius luridus</i> Hahn (Lygaeidae)	8	<i>Heterocordylus parvulus</i> Reuter (Miridae)	2
<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton (Lygaeidae)	8	<i>Polymerus vulneratus</i> (Panzer) (Miridae)	2
<i>Taphropeltus hamulatus</i> (Thomson) (Lygaeidae)	8	<i>Tropidosteptes pacificus</i> (Van Duzee) (Miridae)	2
<i>Trapezonotus ullrichi</i> (Fieber) (Lygaeidae)	8	<i>Naucoris maculatus</i> Fabricius (Naucoridae)	2
<i>Acalypta platycheila</i> (Fieber) (Tingidae)	8	<i>Byrsinus flavicornis</i> (Fabricius) (Cydnidae)	1
<i>Cimex columbarius</i> Jenyns (Cimicidae)	8	<i>Geotomus petiti</i> Wagner (Cydnidae)	1
<i>Loricula inconspicua</i> (Douglas & Scott) (Microphysidae)	8	<i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank) (Scutelleridae)	1

TABLE 3 (CONTINUED).

<i>Jalla dumosa</i> (Linnaeus) (Pentatomidae)	1	<i>Nabis capsiformis</i> Germar (Nabidae)	1
<i>Sciocoris sideritidis</i> Wollaston (Pentatomidae)	1	<i>Amphiareus constrictus</i> (Stål) (Anthocoridae)	1
<i>Belonochilus numenius</i> (Say) (Lygaeidae)	1	<i>Loricula ruficeps</i> (Reuter) (Microphysidae)	1
<i>Horvathiolus superbus</i> (Pollich) (Lygaeidae)	1	<i>Apolygus limbatus</i> (Fallén) (Miridae)	1
<i>Melanocoryphus albomaculatus</i> (Goeze) (Lygaeidae)	1	<i>Hadrodemus m-flavum</i> (Goeze) (Miridae)	1
<i>Peritrechus angusticollis</i> (R.F. Sahlberg) (Lygaeidae)	1	<i>Monosynamma maritimum</i> (Wagner) (Miridae)	1
<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> (Schilling) (Lygaeidae)	1	<i>Pilophorus confusus</i> (Kirschbaum) (Miridae)	1
<i>Spilostethus pandurus</i> (Scopoli) (Lygaeidae)	1	<i>Saldula melanoscela</i> (Fieber) (Saldidae)	1
<i>Corythucha ciliata</i> (Say) (Tingidae)	1	<i>Saldula setulosa</i> (Puton) (Saldidae)	1
<i>Physatocheila harwoodi</i> China (Tingidae)	1	<i>Sigara longipalis</i> (J. Sahlberg) (Corixidae)	1
<i>Oncocephalus pilicornis</i> Reuter (Reduviidae)	1	TOTAL	28805





FIGURE 3. Bar chart showing the frequency of species for ranges of recorded vice-counties.

TABLE 4. The codes and *Hemipterist* volume: pages of the articles referred to in the record lists.


(1w) 1: 38-103	(5d) 5: 16-24	(6J) 6: 245	(9q) 9: 291
(2d) 2: 8	(5f) 5: 25-37	(6L) 6: 245	(9r) 9: 291
(2g) 2: 12-20	(5g) 5: 37-38	(6N) 6: 246-252	(9s) 9: 292-306
(2h) 2: 21-24	(5h) 5: 39-51	(6O) 6: 253-259	(9t) 9: 307
(2i) 2: 25-26	(5j) 5: 69-77	(6Q) 6: 261	(9u) 9: 308
(2j) 2: 26-27	(5l) 5: 92-100	(6R) 6: 261	(9y) 9: 315
(2k) 2: 28-29	(5o) 5: 119-130	(6S) 6: 263-264	(9z) 9: 315
(2l) 2: 30-39	(5q) 5: 135-137	(6T) 6: 264	(9A) 9: 315
(2m) 2: 39	(5r) 5: 138-145	(6V) 6: 265-269	(9B) 9: 316-317
(2n) 2: 40-45	(5s) 5: 146-147	(6Y) 6: 270	(9C) 9: 317
(2o) 2: 46-47	(5t) 5: 147	(6Z) 6: 271-272	(10b) 10: 272-274
(2p) 2: 47-48	(5v) 5: 154	(6α) 6: 272-274	(10c) 10: 275
(2q) 2: 48	(5w) 5: 155-157	(6β) 6: 274-275	(10d) 10: 276-281
(2v) 2: 56-58	(5x) 5: 158-185	(6γ) 6: 275	(10f) 10: 282
(2x) 2: 59-66	(5y) 5: 186-187	(6δ) 6: 276-279	(10g) 10: 283-284
(3d) 3: 17-18	(5A) 5: 188-190	(6ε) 6: 280-281	(10h) 10: 285-286
(3e) 3: 19-38	(5B) 5: 191-204	(6θ) 6: 283	(10j) 10: 288
(3f) 3: 39-53	(5C) 5: 205-210	(7m) 7: 277-278	(10k) 10: 289
(3g) 3: 53-55	(5D) 5: 211-212	(7o) 7: 280	(10l) 10: 290-293
(3h) 3: 56	(6c) 6: 214-216	(7q) 7: 284-285	(10n) 10: 294-295
(3l) 3: 70-72	(6d) 6: 217	(7r) 7: 286-311	(10o) 10: 296-298
(3o) 3: 74-91	(6e) 6: 217	(7s) 7: 312-319	(10q) 10: 298
(3p) 3: 92-100	(6f) 6: 218-219	(7v) 7: 321	(10r) 10: 298
(3q) 3: 100-102	(6g) 6: 219	(7x) 7: 325	(10s) 10: 299-304
(3r) 3: 103-109	(6h) 6: 220-221	(7z) 7: 326	(10u) 10: 305
(3t) 3: 111-112	(6i) 6: 221	(7A) 7: 326	(10v) 10: 305-306
(3v) 3: 115-123	(6j) 6: 221	(7B) 7: 326	(10w) 10: 307
(3w) 3: 124-125	(6k) 6: 222	(7C) 7: 326	(10x) 10: 307
(3y) 3: 129	(6l) 6: 222	(7F) 7: 328-331	(10y) 10: 308-310
(3z) 3: 130	(6m) 6: 222	(7G) 7: 331	(10z) 10: 310
(4b) 4: 15-16	(6n) 6: 222	(7H) 7: 331	(10B) 10: 312
(4d) 4: 24-25	(6o) 6: 222	(7I) 7: 332	(10C) 10: 312
(4e) 4: 26-44	(6p) 6: 223-229	(7J) 7: 333-334	(10D) 10: 312
(4f) 4: 45-47	(6q) 6: 230	(8c) 8: 276-277	(10E) 10: 312
(4h) 4: 48-51	(6r) 6: 230	(8d) 8: 277-278	(11b) 11: 273-275
(4j) 4: 62-64	(6s) 6: 230	(8e) 8: 278	(11d) 11: 277-278
(4k) 4: 65-66	(6t) 6: 231-232	(8f) 8: 279	(11e) 11: 278
(4m) 4: 81-84	(6u) 6: 232	(8g) 8: 280-281	(11f) 11: 279-283
(4n) 4: 85-97	(6v) 6: 232	(8h) 8: 282-283	(11g) 11: 283
(4p) 4: 101-111	(6w) 6: 233	(8i) 8: 283	(11h) 11: 283
(4q) 4: 112-126	(6x) 6: 234-235	(8j) 8: 284	(12h) 12: 277
(4s) 4: 127-129	(6y) 6: 235-236	(8n) 8: 285-286	(12i) 12: 277-278
(4t) 4: 130-143	(6z) 6: 237-239	(8o) 8: 286	(12k) 12: 280
(4v) 4: 144-145	(6A) 6: 239	(9h) 9: 275-276	(12m) 12: 280
(4w) 4: 146	(6C) 6: 240	(9i) 9: 277-284	(12o) 12: 280
(4x) 4: 147-149	(6F) 6: 241	(9j) 9: 284	(12p) 12: 281-282
(4y) 4: 150-152	(6G) 6: 242	(9k) 9: 285	(13g) 13: 272-273
(4z) 4: 152	(6H) 6: 243-244	(9l) 9: 286	(13j) 13: 276-279

1. *Aneurus avenius* (Dufour) (Aradidae)




A total of 34 vice-county records: 3(6y); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(7s); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(3z); 22(1w); 23(5B); 24(1w); 26(5f); 28(4e); 29(1w); 30(3q); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 40(5w); 41(1w); 42(4y); 44(1w); 53(8f); 54(13g); 55(9h); 61(11f); 64(11f).

2. *Aneurus laevis* (Fabricius) (Aradidae)




A total of 32 vice-county records: 3(5B); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5B); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 29(4v); 30(5q); 31(7r); 32(5B); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 40(1w); 41(5B); 44(2n); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 66(1w).

3. *Aradus aterrimus* Fieber (Aradidae)




A total of 4 vice-county records: 13(5h); 15(4t); 16(4t); 28(4e).

4. *Aradus betulae* (Linnaeus) (Aradidae)




A total of 6 vice-county records: 86(5x); 88(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 106(5x).

5. *Aradus cinnamomeus* Panzer (Aradidae)




A total of 10 vice-county records: 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(7s); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 49(5B); 52(5B).

6. *Aradus corticalis* (Linnaeus) (Aradidae)




A total of 4 vice-county records: 9(1w); 11(3f); 16(4t); 17(6y).

7. *Aradus depressus* (Fabricius) (Aradidae)




A total of 62 vice-county records: 2(2g); 3(10y); 4(10y); 6(5B); 7(8h); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5v); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(4y); 44(5B); 46(1w); 50(5B); 51(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(5r); 68(5r); 69(4y); 70(1w); 88(5x); 89(8f); 95(5B); 96(5x); H2(3e); H13(4s); H15(3e).

8. *Acanthosoma haemorrhoidale* (Linnaeus) (Acanthosomatidae)




A total of 137 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5B); 6(5l); 7(5B); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(2n); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4w); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5B); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 93(5x); 95(5B); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 103(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5B); 107(5B); 108(5B); 109(5B); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H6(3e); H7(5C); H8(5C); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H15(5C); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H24(5C); H25(3e); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H31(3e); H33(3e); H34(5C); H35(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

9. *Cyphostethus tristriatus* (Fabricius) (Acanthosomatidae)




A total of 77 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(6Z); 5(6S); 6(5B); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(4y); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3y); 41(1w); 44(2n); 45(2n); 46(5B); 49(5B); 50(6f); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(6O); 62(6O); 63(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(5B); 71(5B); 72(5x); 82(5x); 89(5x); 92(5x); 93(5x); 96(5B); H4(10d); H5(10d); H10(3e); H15(3e); H21(3e); H38(5B); H39(3e).

10. *Elasmostethus interstinctus* (Linnaeus) (Acanthosomatidae)




A total of 123 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5B); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 42(1w); 44(2n); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5B); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 75(5x); 76(10s); 77(5B); 79(10s); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 89(9i); 90(5B); 91(8g); 92(5x); 94(5B); 95(5x); 96(5B); 97(5B); 98(5B); 99(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(5C); H8(5C); H10(5C); H11(5C); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H15(3e); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H27(3e); H32(5C); H33(5C); H35(3e); H37(3e); H38(5B); H39(3e); H40(5C).

11. *Elasmucha ferrugata* (Fabricius) (Acanthosomatidae)




A total of 4 vice-county records: 49(1w); 57(1w); 63(4n); 64(11f).

12. *Elasmucha grisea* (Linnaeus) (Acanthosomatidae)




A total of 108 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5B); 6(5B); 7(5B); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3y); 41(5B); 46(1w); 47(5B); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 77(10d); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 85(5x); 88(5x); 91(8g); 92(5x); 93(5B); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(7q); 103(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(5C); H7(5C); H9(5C); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H15(5C); H16(5C); H17(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H25(3e); H27(5C); H33(5C); H34(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

13. *Adomerus biguttatus* (Linnaeus) (Cydnidae)




A total of 31 vice-county records: 3(5o); 4(5o); 5(9k); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 28(4e); 34(5B); 35(1w); 37(1w); 40(3y); 48(5B); 49(1w); 62(11f); 70(1w); 88(5x); 95(11d); 96(7q); 99(7q).

14. *Byrsinus flavicornis* (Fabricius) (Cydnidae)



Only one vice-county record: 10(3f).

15. *Canthophorus impressus* (Horváth) (Cydnidae)




A total of 14 vice-county records: 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(5h); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 20(5D); 22(1w); 23(1w); 26(5B); 33(2l).

16. *Geotomus petiti* Wagner (Cydnidae)




Only one vice-county record: 15(7q).

17. *Geotomus punctulatus* (A. Costa) (Cydnidae)




A total of 4 vice-county records: 1(2g); 2(5B); 9(1w); 41(1w).

18. *Legnotus limbosus* (Geoffroy) (Cydnidae)




A total of 50 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 38(2h); 40(3q); 41(5B); 46(5B); 49(5B); 50(4y); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 58(7x); 59(7x); 61(5B); 62(6z); 63(4n); 66(1w).

19. *Legnotus picipes* (Fallén) (Cydnidae)




A total of 20 vice-county records: 1(2g); 5(5l); 9(6y); 10(3f); 11(3r); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 54(3o); 61(4n); 63(11f).

20. *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey (Cydnidae)




A total of 48 vice-county records: 3(5o); 6(7s); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(5B); 30(1w); 31(5B); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(60); 38(3p); 40(3y); 41(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(5B); 58(10d); 59(5d); 60(10d); 61(5B); 62(11f); 63(4n); H11(3e); H13(4s); H19(3e).

21. *Tritomegas bicolor* (Linnaeus) (Cydnidae)



A total of 57 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 6(5I); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(5B); 40(3y); 41(1w); 45(1w); 50(6f); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5B); 60(10d); 61(4n); 62(6z); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5B).

22. *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur) (Cydnidae)




A total of 8 vice-county records: 14(11f); 15(4t); 16(5B); 17(7z); 18(9h); 19(10d); 21(3q); 30(7s).

23. *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy) (Plataspidae)



A total of 2 vice-county records: 14(7F); 15(11f).

24. *Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus) (Thyreocoridae)




A total of 43 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 4(5o); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(5B); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 38(1w); 41(1w); 44(1w); 52(1w); 54(3o); 55(5B); 59(5d); 60(6Z); 63(4n); 69(5B); 70(5B); H6(4s); H12(3e).

25. *Eurygaster austriaca* (Schrank) (Scutelleridae)




Only one vice-county record: 15(4t).

26. *Eurygaster maura* (Linnaeus) (Scutelleridae)




A total of 12 vice-county records: 9(1w); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 21(1w); 23(1w); 29(1w); 34(5B); 41(1w); 45(2n).

27. *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy) (Scutelleridae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5B); 6(5l); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5B); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(4y); 22(2i); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(5B); 38(3p); 40(3q); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(5B); 49(5B); 52(5B); 53(12i); 54(13g); 55(5B); 58(10d); 61(11f); 62(11f); 63(11f); 64(11f); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H11(5C); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H15(5C); H19(5C); H20(3e); H24(5C); H25(5C); H26(5C).

28. *Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus) (Scutelleridae)




A total of 8 vice-county records: 1(2g); 10(3f); 15(4t); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 45(1w); 58(1w).

29. *Odontoscelis lineola* Rambur (Scutelleridae)




A total of 16 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 4(5o); 10(3f); 12(3f); 14(5h); 15(4t); 17(1w); 25(5f); 26(5f); 27(11b); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 45(5B).

30. *Aelia acuminata* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 61 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5B); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(2j); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 37(60); 38(1w); 39(3p); 40(3y); 41(1w); 42(5B); 44(5B); 45(2n); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(11f); 62(11f); 63(4n); 64(11f).

31. *Carpocoris purpureipennis* (De Geer) Aggregate (Pentatomidae)




A total of 9 vice-county records: 1(10g); 3(10g); 9(10g); 13(10g); 14(10g); 15(10g); 19(10g); 22(10g); 34(10g).

32. *Chlorochroa juniperina* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 7 vice-county records: 8(5j); 16(4t); 17(1w); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 59(5d).

33. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 105 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 35(4y); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(3p); 57(3p); 58(1w); 59(5B); 60(5d); 61(4n); 62(6c); 63(4n); 64(5B); 65(11f); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 71(5d); 73(5B); 74(5B); 75(5B); 81(5x); 85(5x); 86(5B); 87(5B); 89(5x); 90(5B); 91(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H10(5C); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H16(3e); H17(5C); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(5C); H22(5C); H24(5C); H25(5C); H27(3e); H30(5C); H31(5C); H37(5C).

34. *Dyroderes umbraculatus* (Fabricius) (Pentatomidae)




A total of 5 vice-county records: 11(4s); 14(11f); 15(11f); 16(11f); 21(1w).

35. *Eurydema dominulus* (Scopoli) (Pentatomidae)



A total of 13 vice-county records: 9(1w); 12(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 21(4f); 27(4e); 32(1w); 41(1w); 63(5B); 64(5B).

36. *Eurydema oleracea* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 44 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 5(5B); 6(5B); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(5B); 33(2l); 34(2l); 35(3q); 37(5B); 38(3p); 40(3y); 53(5B); 54(5B); 55(5B); 58(10d); 61(11f); 62(11f); 63(11f); 64(11f).

37. *Eurydema ornata* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 10 vice-county records: 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(5h); 14(5h); 17(1w); 19(10d); 33(8d); 35(4q); 62(11f).

38. *Eysarcoris aeneus* (Scopoli) (Pentatomidae)




A total of 9 vice-county records: 1(2g); 10(3f); 11(3f); 14(5h); 15(4t); 17(4f); 26(5f); 30(1w); 46(1w).

39. *Eysarcoris venustissimus* (Schrank) (Pentatomidae)




A total of 51 vice-county records: 2(2g); 3(5B); 5(5B); 6(5B); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6Y); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 36(5B); 37(5B); 38(2h); 39(3p); 40(3y); 41(5B); 42(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(3p); 57(3p); 58(1w); 61(5g); 62(6z); 63(4n); 64(5B); 65(11f).

40. *Graphosoma italicum* (Müller) (Pentatomidae)



A total of 2 vice-county records: 17(10d); 19(10d).

41. *Halyomorpha halys* (Stål) (Pentatomidae)




A total of 5 vice-county records: 3(10y); 12(8i); 18(8i); 21(8i); 55(8i).

42. *Jalla dumosa* (Linnaeus) (Pentatomidae)




Only one vice-county record: 15(4t).

43. *Mecidea lindbergi* Wagner (Pentatomidae)




A total of 3 vice-county records: 3(5o); 9(4s); 11(3r).

44. *Neottiglossa pusilla* (Gmelin) (Pentatomidae)




A total of 44 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(5l); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 34(4s); 37(1w); 38(1w); 39(7s); 40(3y); 43(4s); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(5B); 57(3p); 61(11f); 62(11f); 63(4n).

45. *Nezara viridula* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 13 vice-county records: 11(3f); 13(7F); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(2o); 21(1w); 29(1w); 33(8d); 34(8d); 58(10d); 59(10d); H21(6y).

46. *Palomena prasina* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 106 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(5B); 63(4n); 64(5B); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(5B); 71(5B); 95(5x); 96(5B); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H14(5C); H15(5C); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(5C); H22(5C); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(3e); H27(5C); H28(5C); H31(5C); H32(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e).

47. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 138 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6d); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3y); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 74(5B); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(5B); 80(9i); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5B); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 98(5B); 99(7q); 100(5x); 101(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H10(3e); H11(3e); H12(5C); H13(5C); H15(5C); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H32(5C); H33(5C); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(5B); H40(5C).

48. *Peribalus strictus* (Fabricius) (Pentatomidae)




A total of 16 vice-county records: 3(5o); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(11f); 18(11f); 21(1w); 25(5f); 27(4e); 44(5B); 70(1w).

49. *Picromerus bidens* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 120 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5B); 6(5B); 7(6T); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3y); 41(1w); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(5r); 67(5B); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5B); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 82(5B); 85(5x); 86(5B); 87(5B); 88(5x); 90(5B); 91(8g); 92(5x); 93(5x); 95(5B); 96(5B); 97(5B); 98(5B); 100(5B); 103(5B); 104(5x); 106(5B); 107(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(5C); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H16(3e); H17(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H24(5C); H27(5C); H28(5C); H31(5C); H32(5C); H34(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5B); H39(5C); H40(5C).

50. *Piezodorus lituratus* (Fabricius) (Pentatomidae)




A total of 121 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(3y); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(5r); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5B); 75(5B); 77(5B); 78(5B); 81(5x); 82(5x); 83(5B); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 90(5B); 91(5B); 92(5x); 93(5B); 94(5B); 95(5x); 96(5B); 98(5x); 104(5B); 105(5B); 106(5B); 109(5B); H1(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(5C); H9(5C); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H14(3e); H15(5C); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H24(5C); H27(5C); H28(5C); H32(5C); H34(5C); H36(3e); H37(3e); H38(5B); H39(3e); H40(5C).

51. *Podops inunctus* (Fabricius) (Pentatomidae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(6s); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 41(1w); 45(2n); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(5B); 57(5B); 63(4n).

52. *Rhacognathus punctatus* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 71 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(6y); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 22(1w); 23(4s); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 34(2l); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3q); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(5B); 50(1w); 52(1w); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(5B); 65(11f); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 91(8g); 95(5B); 96(5B); 97(5x); 98(5B); 104(5x); 106(5B); 107(5B); H3(5C); H6(3e); H7(5C); H11(3e); H13(5C); H19(3e); H33(3e); H36(3e); H39(3e); H40(3e).

53. *Rhaphigaster nebulosa* (Poda) (Pentatomidae)




A total of 10 vice-county records: 13(8o); 14(7F); 15(7x); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 21(1w); 30(11f); 59(10d); 60(10d).

54. *Sciocoris cursitans* (Fabricius) (Pentatomidae)



A total of 12 vice-county records: 1(2g); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(4y); 28(5B); 34(5B).

55. *Sciocoris homalonotus* Fieber (Pentatomidae)




A total of 3 vice-county records: 14(11f); 16(5t); 17(11f).

56. *Sciocoris sideritidis* Wollaston (Pentatomidae)




Only one vice-county record: 18(7x).

57. *Troilus luridus* (Fabricius) (Pentatomidae)




A total of 106 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 7(6Q); 8(6y); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(5B); 50(6f); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 66(5r); 67(5B); 69(1w); 70(1w); 73(5B); 82(5B); 83(5B); 85(10b); 88(10b); 90(10b); 92(10b); 95(12m); 96(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H4(5C); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H10(5C); H11(5C); H12(5C); H13(5C); H14(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H19(5C); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H27(5C); H28(5C); H31(3e); H33(5C); H35(5C); H37(5C); H38(3e); H39(5C); H40(5C).

58. *Zicrona caerulea* (Linnaeus) (Pentatomidae)




A total of 103 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5o); 5(6y); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3y); 41(1w); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 47(5B); 48(5B); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(5B); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(6d); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 78(11b); 79(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 89(5x); 90(5x); 95(5B); 96(5x); 100(5x); H1(3e); H4(3e); H6(5C); H9(5C); H10(3e); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H15(3e); H18(3e); H20(3e); H23(3e); H33(5C); H34(3e); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

59. *Arenocoris fallenii* (Schilling) (Coreidae)




A total of 28 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 4(5o); 6(5l); 14(7F); 15(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(7H); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(7r); 32(5B); 37(60); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 49(5B); 61(10f); 63(10f).

60. *Arenocoris waltlii* (Herrich-Schaeffer) (Coreidae)




A total of 7 vice-county records: 15(4t); 25(5f); 26(5f); 27(12i); 28(4e); 29(3p); 31(7r).

61. *Bathysolen nubilus* (Fallén) (Coreidae)




A total of 18 vice-county records: 12(3f); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 21(1w); 22(1w); 24(1w); 25(11b); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(5B); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 54(7s).

62. *Ceraleptus lividus* Stein (Coreidae)




A total of 33 vice-county records: 6(5l); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(5D); 21(1w); 22(1w); 23(5s); 24(1w); 25(5B); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(5B); 32(7r); 37(6θ); 38(3p); 39(7s); 40(3q); 45(2n); 53(3o); 56(3q); 59(10d); 63(4n).

63. *Coreus marginatus* (Linnaeus) (Coreidae)




A total of 72 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5B); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(5B); 32(2j); 33(5B); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(3p); 39(3p); 40(3y); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(7o); 52(5B); 53(3o); 55(3p); 56(5B); 57(5B); 58(6a); 59(5B); 61(11f); 62(4n); 63(5B); 64(5B); 65(11f); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(5C); H9(5C); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H20(3e).

64. *Coriomeris denticulatus* (Scopoli) (Coreidae)




A total of 60 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(3y); 41(1w); 45(1w); 46(5B); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(5B); 57(3p); 58(1w); 59(5B); 60(5d); 61(5B); 62(5B); 63(4n); 64(5B); 67(7s); 69(5B).

65. *Enoplops scapha* (Fabricius) (Coreidae)




A total of 17 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 9(1w); 10(3f); 14(5h); 15(4t); 34(5B); 41(1w); 44(2n); 45(1w); 46(2n); 49(1w); 52(1w); 62(4n); 66(1w).

66. *Gonocerus acuteangulatus* (Goeze) (Coreidae)




A total of 36 vice-county records: 5(6S); 6(5B); 7(5B); 8(5B); 9(4s); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5B); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(5B); 30(1w); 31(7r); 32(5B); 33(2l); 34(2l); 37(5B); 38(5B); 53(5B); 55(3q); 61(11f); 63(10f).

67. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Coreidae)




A total of 76 vice-county records: 1(5B); 2(2g); 3(5B); 4(5B); 5(5B); 6(5B); 7(5B); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(5t); 24(5B); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(5B); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(1w); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(5B); 40(3y); 41(5B); 43(5B); 44(5B); 45(5B); 46(5B); 48(5B); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5B); 60(5d); 61(5B); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5B); 66(1w); 67(5B); 69(1w); 70(5B); 71(5B); 74(5B); 85(5B); 90(5B); 111(5B); H12(3e); H21(5B); H38(3e); H40(5B).

68. *Spathocera dalmanii* (Schilling) (Coreidae)




A total of 16 vice-county records: 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 15(4t); 16(6Z); 17(1w); 18(5B); 19(4p); 21(1w); 22(1w); 25(5f); 26(5B); 28(4e); 30(1w); 39(1w).

69. *Syromastus rhombeus* (Linnaeus) (Coreidae)




A total of 34 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 6(5l); 8(5t); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 34(2l); 35(5B); 45(1w); 54(3o).

70. *Alydus calcaratus* (Linnaeus) (Alydidae)




A total of 37 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(6y); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 34(2l); 37(1w); 39(5B); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(5B); 48(1w); 52(5B); 58(1w); 62(4n); H38(3e).

71. *Brachycarenum tigrinus* (Schilling) (Rhopalidae)




A total of 14 vice-county records: 14(8o); 15(7B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 21(4s); 23(1w); 25(5f); 26(6N); 28(6N); 29(7r); 30(11b); 31(7r); 63(10f).

72. *Chorosoma schillingii* (Schilling) (Rhopalidae)




A total of 40 vice-county records: 1(2g); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 21(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 37(1w); 38(1w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 56(5B); 57(4n); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 63(4n); 64(11f); 69(1w); 70(1w).

73. *Corizus hyoscyami* (Linnaeus) (Rhopalidae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5B); 6(5I); 7(5j); 8(5t); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(6Y); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(3p); 39(5B); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(7o); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5B); 61(4n); 62(6c); 63(4n); 64(5B); 65(11f); 66(5B); 71(5B); 82(9h); H12(3e); H20(3e).

74. *Liorhyssus hyalinus* (Fabricius) (Rhopalidae)




A total of 40 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5o); 5(5B); 6(5l); 8(5j); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4z); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 37(60); 41(1w); 45(1w); 48(1w); 49(1w); 52(1w); 58(1w); 61(11f); 70(1w); H2(3e); H21(3e); H38(3e).

75. *Myrmus miriformis* (Fallén) (Rhopalidae)




A total of 65 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3y); 41(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(5B); 50(7o); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 67(5B); 69(5B); 70(1w).

76. *Rhopalus maculatus* (Fieber) (Rhopalidae)




A total of 16 vice-county records: 8(5j); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 30(5q); 46(1w); 58(1w).

77. *Rhopalus parumpunctatus* Schilling (Rhopalidae)




A total of 33 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 8(5j); 9(1w); 10(5B); 11(3f); 12(3f); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(3h); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 33(11f); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(5B); 52(5B); 54(3o); 55(1w).

78. *Rhopalus rufus* Schilling (Rhopalidae)




A total of 13 vice-county records: 8(5j); 9(1w); 12(3f); 17(1w); 22(9s); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 28(4e); 29(7r); 32(1w); 41(1w); 45(1w).

79. *Rhopalus subrufus* (Gmelin) (Rhopalidae)




A total of 58 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(4y); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(5B); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(3y); 41(1w); 43(5B); 47(5B); 49(5B); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(5B); 57(3p); 58(10d); 59(5B); 60(5d); 61(5B); 62(6z); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 66(5B); 69(5B).

80. *Stictopleurus abutilon* (Rossi) (Rhopalidae)




A total of 28 vice-county records: 6(5l); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5B); 14(5B); 15(4t); 16(4z); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 40(3y); 61(4n).

81. *Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze) (Rhopalidae)




A total of 35 vice-county records: 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(4s); 31(6Y); 32(3p); 33(2l); 37(1w); 38(3p); 39(3p); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(3p); 61(5B); 62(6z); 63(4n); 64(11f).

82. *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus) (Pyrrhocoridae)



A total of 20 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 4(6Z); 6(5B); 9(1w); 13(5B); 15(5B); 17(1w); 18(10d); 19(10d); 25(5f); 27(4e); 30(1w); 34(5B); 36(5B); 41(1w); 48(1w); 49(1w); 63(4n); 64(4n).

83. *Dicranocephalus agilis* (Scopoli) (Stenocephalidae)




A total of 24 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 9(1w); 10(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 17(1w); 24(1w); 37(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 52(1w); 59(10d); H3(3e); H6(3e); H12(3e); H20(3e).

84. *Dicranocephalus albipes* (Fabricius) (Stenocephalidae)




A total of 2 vice-county records: 11(3f); 45(2n).

85. *Dicranocephalus medius* (Mulsant & Rey) (Stenocephalidae)




A total of 22 vice-county records: 3(5o); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4s); 13(5h); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(10d); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 40(3y).

86. *Acompus pallipes* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)




A total of 5 vice-county records: 19(5f); 21(7x); 22(1w); 23(1w); 24(7x).

87. *Acompus rufipes* (Wolff) (Lygaeidae)




A total of 31 vice-county records: 1(2g); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 29(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 39(5B); 40(5w); 50(9k); 54(3o); 57(5B); 58(10d); 64(4n); 66(1w); 69(1w).

88. *Aphanus rolandri* (Linnaeus) (Lygaeidae)




A total of 28 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 8(5j); 9(1w); 11(3f); 12(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(9z); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(7s); 30(1w); 31(7r); 38(1w); 53(3o); 63(10f); 67(5r).

89. *Arocatus roeselii* Schilling Aggregate (Lygaeidae)




A total of 18 vice-county records: 11(7s); 12(6q); 13(7F); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(7s); 27(11b); 28(8f); 29(1w); 30(1w); 31(4q); 34(8d); 55(4s).

90. *Belonochilus numenius* (Say) (Lygaeidae)




Only one vice-county record: 21(10d).

91. *Beosus maritimus* (Scopoli) (Lygaeidae)




A total of 14 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 9(1w); 10(3f); 11(4s); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 17(11f); 38(1w); 41(1w); 44(5B); 45(1w).

92. *Chilacis typhae* (Perris) (Lygaeidae)




A total of 78 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 5(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 36(9k); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(5B); 44(2n); 46(1w); 49(4s); 50(5B); 51(5B); 52(4s); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 75(5x); 76(5x); 80(8i); 81(8i); 82(8i); 83(8i); 85(8i); 86(7x); 90(8i); H4(5C); H12(5C); H13(5C); H15(5C); H21(3e); H26(3e); H33(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

93. *Cymus aurescens* Distant (Lygaeidae)




A total of 6 vice-county records: 11(4x); 12(4x); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 22(1w).

94. *Cymus claviculus* (Fallén) (Lygaeidae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 2(7s); 3(5o); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 31(6ð); 32(5B); 33(2l); 35(1w); 36(1w); 38(1w); 39(7s); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 49(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 70(5B); H1(3e); H9(5C); H11(5C); H12(3e); H13(5C); H17(5C); H20(3e); H26(5C); H38(5C).

95. *Cymus glandicolor* Hahn (Lygaeidae)




A total of 108 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(5B); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 69(1w); 70(1w); 73(5x); 79(8i); 80(8i); 81(8i); 82(5x); 83(5x); 85(5x); 87(8i); 88(8i); 89(5x); 90(8i); 96(8i); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H14(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H24(5C); H26(5C); H27(3e); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H35(5C); H36(5C); H37(5C); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

96. *Cymus melanocephalus* Fieber (Lygaeidae)




A total of 59 vice-county records: 2(2g); 3(5B); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(4y); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(6G); 37(6θ); 38(1w); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 45(2n); 46(1w); 49(5B); 50(7s); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(7s); 57(3p); 58(1w); 59(5B); 60(10d); 61(7s); 62(6O); 63(4n); 64(7s); 66(1w); 67(5B).

97. *Drymus brunneus* (R.F. Sahlberg) (Lygaeidae)




A total of 87 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(7s); 6(5B); 9(1w); 11(3r); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(7s); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 43(5B); 44(1w); 46(2n); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 77(5B); 81(5B); 82(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5B); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(5x); 104(5B); 105(5x); 106(5x); 107(5B); 108(5B); H1(5C); H2(3e); H16(3e); H20(3e); H23(5C); H32(5C); H33(5C); H39(5C).

98. *Drymus latus* Douglas & Scott (Lygaeidae)




A total of 24 vice-county records: 9(1w); 10(3f); 11(3f); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 31(6δ); 32(6δ); 37(1w); 38(3p); 50(5B); 54(3o); 63(4n).

99. *Drymus pilicornis* (Mulsant & Rey) (Lygaeidae)




A total of 14 vice-county records: 1(2g); 9(1w); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 29(1w); 52(1w); 66(1w); H9(3e); H15(5C).

100. *Drymus pilipes* Fieber (Lygaeidae)




A total of 11 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 12(3f); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 62(4n); 66(1w).

101. *Drymus pumilio* Puton (Lygaeidae)




A total of 22 vice-county records: 9(1w); 10(3r); 11(3r); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(6v); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(7H); 23(1w); 24(1w); 28(11b); 29(4v); 31(7r); 35(5B); 37(1w); 40(5w); 41(1w); 55(11b).

102. *Drymus ryeii* Douglas & Scott (Lygaeidae)




A total of 60 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 5(7s); 6(5B); 8(7s); 9(1w); 10(3r); 11(3r); 12(3g); 13(7F); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(7s); 28(6N); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 37(6θ); 38(2h); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 45(1w); 46(5B); 49(5B); 50(7o); 52(5B); 54(3o); 55(5B); 56(7s); 57(3p); 60(5d); 61(4n); 63(4n); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 73(5x); 88(5x); 96(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H20(3e); H27(3e).

103. *Drymus sylvaticus* (Fabricius) (Lygaeidae)



A total of 100 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(6y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(5B); 44(1w); 45(5B); 46(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 81(5x); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 94(5B); 95(5x); 96(5B); 104(5x); 105(5x); 106(5B); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H8(3e); H9(5C); H12(3e); H13(5C); H16(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H27(3e); H30(5C); H32(5C); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

104. *Emblethis denticollis* Horváth (Lygaeidae)




A total of 12 vice-county records: 12(3f); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 18(4p); 21(10E); 25(11b); 26(8f); 27(11b); 28(8f); 29(1w); 30(1w).

105. *Emblethis griseus* (Wolff) (Lygaeidae)




A total of 2 vice-county records: 1(2g); 15(4t).

106. *Eremocoris abietis* (Linnaeus) (Lygaeidae)




A total of 5 vice-county records: 15(4t); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 108(5x).

107. *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)




A total of 10 vice-county records: 17(1w); 18(4p); 21(1w); 22(4s); 24(1w); 25(12i); 28(4e); 30(10d); 33(8d); 63(4n).

108. *Eremocoris plebejus* (Fallén) (Lygaeidae)




A total of 14 vice-county records: 14(7F); 15(4t); 17(5B); 29(1w); 41(1w); 59(10d); 69(5B); 70(1w); 73(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 106(5B).

109. *Eremocoris podagricus* (Fabricius) (Lygaeidae)




A total of 30 vice-county records: 2(2g); 4(5o); 9(5B); 12(8e); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(8d); 34(8d); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 53(3o); 55(5B); 63(5B).

110. *Gastrodes abietum* Bergroth (Lygaeidae)




A total of 24 vice-county records: 11(3f); 15(4t); 17(1w); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(3q); 25(5f); 26(5B); 28(4e); 30(5q); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 39(1w); 41(1w); 53(3o); 58(10d); 81(5x); 88(5x); 89(5x); 91(5x); 95(5x); 96(5B).

111. *Gastrodes grossipes* (De Geer) (Lygaeidae)




A total of 90 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 81(5x); 82(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); H1(3e); H2(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(5C); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H27(3e); H29(3e); H33(5C); H37(5C); H38(5C); H40(3e).

112. *Graptopeltus lynceus* (Fabricius) (Lygaeidae)




A total of 30 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 4(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(10d); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 41(1w); 56(1w); 59(5d); 60(5d).

113. *Henestaris halophilus* (Burmeister) (Lygaeidae)




A total of 7 vice-county records: 2(2g); 11(6y); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 28(4e).

114. *Henestaris laticeps* (Curtis) (Lygaeidae)




A total of 14 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 19(6y); 41(1w); 44(2n); 45(1w).

115. *Heterogaster artemisiae* Schilling (Lygaeidae)




A total of 16 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 5(6y); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 17(1w); 23(1w); 26(5f); 33(2l); 34(2l); 70(5B).

116. *Heterogaster urticae* (Fabricius) (Lygaeidae)




A total of 66 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(10y); 6(5B); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 36(6G); 37(5B); 38(1w); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 43(5B); 44(1w); 45(5B); 46(5B); 47(5B); 49(5B); 50(5B); 51(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(5B); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(6z); 63(4n); 64(7s); 65(13g); 69(5B); 70(5B); 82(5x); H12(3e).

117. *Horvathiolus superbus* (Pollich) (Lygaeidae)




Only one vice-county record: 64(7x).

118. *Ischnocoris angustulus* (Boheman) (Lygaeidae)




A total of 23 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 9(1w); 11(3r); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 22(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(5f); 28(4e); 39(3p); 45(1w); 46(5B); 48(5B); 52(1w); H3(3e).

119. *Ischnodemus quadratus* Fieber (Lygaeidae)




A total of 2 vice-county records: 15(4t); 63(11f).

120. *Ischnodemus sabuleti* (Fallén) (Lygaeidae)




A total of 52 vice-county records: 3(7s); 5(7s); 6(5l); 7(6r); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(9k); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 50(6f); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(3p); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 64(4n); 66(3q); H20(3e).

121. *Kleidocerys ericae* (Horváth) (Lygaeidae)




A total of 62 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(6h); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(10n); 30(5q); 31(6δ); 34(2l); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 45(5B); 49(1w); 50(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 66(1w); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(13g); 82(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 92(5x); 96(5B); 97(5B); 106(5x); H22(3e); H38(3e).

122. *Kleidocerys resedae* (Panzer) (Lygaeidae)




A total of 85 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5B); 7(7s); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(5B); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 46(1w); 48(5B); 49(5B); 50(5B); 51(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(3p); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(6x); 63(4n); 64(4n); 69(5B); 70(5B); 76(10s); 79(10s); 81(5x); 83(10n); 89(8f); 92(5x); 95(5x); 96(5B); H2(3e); H3(5C); H4(5C); H6(3e); H7(5C); H8(5C); H16(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H33(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

123. *Lamproplax picea* (Flor) (Lygaeidae)




A total of 54 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 5(9k); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(7q); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 21(1w); 22(1w); 24(1w); 26(5f); 28(4e); 29(1w); 34(2l); 38(2h); 39(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 45(2n); 46(2n); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 56(1w); 58(1w); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 70(1w); 72(5x); 81(11b); 88(5x); 89(5x); 95(10k); 100(5x); 104(5x); H1(3e); H2(3e); H9(5C); H25(5C); H30(5C); H32(5C); H33(5C); H38(5C).

124. *Lasiosomus enervis* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)




A total of 24 vice-county records: 2(4s); 3(5o); 4(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(8o); 14(5h); 15(4t); 17(1w); 18(4p); 22(1w); 23(1w); 25(5f); 28(4e); 30(5q); 33(2l); 35(5B); 37(1w); 38(3p); 40(5w); 61(6c); H6(3e).

125. *Lygaeus equestris* (Linnaeus) Aggregate (Lygaeidae)




A total of 3 vice-county records: 4(10h); 13(10h); 15(10h).

126. *Macrodema microptera* (Curtis) (Lygaeidae)




A total of 55 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(5B); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(5B); 54(3o); 56(5B); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 70(1w); 71(5B); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 105(5x); H3(3e); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H38(5B).

127. *Macroplax preysleri* (Fieber) (Lygaeidae)




A total of 4 vice-county records: 6(5l); 33(2l); 34(2l); 41(1w).

128. *Megalonotus antennatus* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 31 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(5D); 22(5s); 24(1w); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 37(1w); 38(2h); 39(8o); 53(10n); 54(3o); 55(11b); 57(4s); 63(4n).

129. *Megalonotus chiragra* (Fabricius) (Lygaeidae)




A total of 53 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 7(6T); 9(5B); 10(3r); 11(3r); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(4y); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(6x); 22(1w); 23(1w); 24(7s); 25(11b); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 38(2h); 39(3p); 40(3q); 41(5B); 44(1w); 45(1w); 49(5B); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 63(7s); 69(1w); 70(5B); H12(5C).

130. *Megalonotus dilatatus* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)




A total of 40 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(9k); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 34(2l); 37(1w); 38(1w); 40(3q); 41(1w); 45(1w); 50(6f); 52(5B); 54(3o); 56(1w); 58(1w); 61(4n); 63(4n); 88(5x); H2(3e).

131. *Megalonotus emarginatus* (Rey) (Lygaeidae)




A total of 33 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(9k); 8(9k); 9(1w); 12(4x); 13(7F); 15(4t); 16(4t); 17(4y); 18(4p); 19(4p); 20(4y); 21(4y); 22(1w); 23(1w); 25(11b); 26(8f); 27(11b); 28(11b); 29(3p); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 33(8d); 37(1w); 38(2h); 39(9k); 40(5w); 53(3o); 55(5B); 63(4n).

132. *Megalonotus praetextatus* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)



A total of 33 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5A); 6(5l); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(7s); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(5s); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 48(1w); 49(5B); 61(4n); 63(10f).

133. *Megalonotus sabulicola* (Thomson) (Lygaeidae)




A total of 19 vice-county records: 1(2g); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 22(5s); 25(5f); 26(5f); 27(11b); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 53(3o); 61(4n).

134. *Melanocoryphus albomaculatus* (Goeze) (Lygaeidae)




Only one vice-county record: 30(7m).

135. *Metopoplax ditomoides* (A. Costa) (Lygaeidae)




A total of 23 vice-county records: 7(6T); 8(10r); 11(6L); 12(3f); 13(5h); 14(7F); 15(6L); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(6H); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(11b); 26(6N); 27(11b); 28(6N); 30(1w); 32(7r); 37(1w); 54(3o).

136. *Metopoplax fuscinervis* Stål (Lygaeidae)




A total of 9 vice-county records: 12(4x); 14(11f); 16(6k); 17(4y); 18(4p); 23(6g); 28(12i); 31(7r); 61(6c).

137. *Notochilus limbatus* Fieber (Lygaeidae)




A total of 6 vice-county records: 3(5o); 4(5o); 9(1w); 11(3f); 21(1w); 37(1w).

138. *Nysius cymoides* (Spinola) (Lygaeidae)




A total of 7 vice-county records: 13(7F); 22(11h); 29(7r); 31(7r); 61(4n); H38(6y); H39(5t).

139. *Nysius ericae* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 55 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 5(5l); 6(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(7F); 15(5B); 16(4t); 17(6x); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(3q); 23(5s); 24(4f); 25(5B); 26(5f); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 48(5B); 49(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 70(5B); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 96(5B).

140. *Nysius graminicola* (Kolenati) (Lygaeidae)




A total of 16 vice-county records: 9(1w); 10(7s); 11(3f); 13(5h); 15(5B); 18(4p); 20(1w); 22(9s); 23(1w); 25(11b); 27(13g); 28(10n); 29(7r); 31(7r); 33(7s); 54(13g).

141. *Nysius helveticus* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)




A total of 7 vice-county records: 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 16(4t); 17(1w); 22(1w).

142. *Nysius huttoni* F.B. White (Lygaeidae)




A total of 35 vice-county records: 11(6w); 12(6w); 13(5h); 14(5h); 15(4z); 16(6w); 17(4s); 18(4p); 19(4p); 20(3h); 21(6w); 22(6i); 23(6g); 24(6j); 25(5f); 26(5A); 27(10n); 28(4e); 29(3p); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 33(8d); 40(5w); 54(7s); 55(11b); 57(3p); 58(10d); 59(10d); 60(10d); 61(6c); 62(6O); 63(4n); 64(11f); H13(11f).

143. *Nysius senecionis* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 34 vice-county records: 8(10r); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4z); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 38(3p); 40(5w); 53(3o); 54(3o); 59(10d); 61(4n); 62(11f); 63(4n).

144. *Nysius thymi* (Wolff) (Lygaeidae)




A total of 61 vice-county records: 1(2g); 2(7s); 3(10y); 4(5o); 6(5B); 11(3f); 12(3f); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(4z); 17(6x); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 25(5B); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 38(3p); 40(5w); 41(5B); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 48(5B); 49(5B); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(5B); 64(4n); 65(7q); 67(5B); 68(5B); 70(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 92(5x); 96(5x); 104(5x); 105(5B); 107(5x); 108(5B); H1(3e); H9(5C); H16(5C); H21(5C); H38(5C); H39(7s); H40(5C).

145. *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey) (Lygaeidae)



A total of 33 vice-county records: 3(10y); 5(6S); 8(5t); 9(1w); 11(3f); 12(3q); 13(6t); 14(6t); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(2o); 21(3v); 22(1w); 23(1w); 24(4k); 27(11b); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 38(3p); 40(5w); 53(3o); 55(5B); 61(6O); 62(6O); 63(11f).

146. *Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)




A total of 6 vice-county records: 9(1w); 14(5h); 15(4t); 26(5f); 28(4e); 54(3o).

147. *Oxycarenum modestus* (Fallén) (Lygaeidae)




A total of 3 vice-county records: 18(7s); 21(5t); 26(13g).

148. *Pachybrachius fracticollis* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 62 vice-county records: 2(2g); 5(5l); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 15(4t); 17(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 36(1w); 37(1w); 39(1w); 40(1w); 41(5B); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(5B); 50(5B); 52(5B); 58(1w); 63(4n); 69(5B); 70(1w); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H9(5C); H10(5C); H11(5C); H12(5C); H14(5C); H15(5C); H19(5C); H20(3e); H23(5C); H25(5C); H26(5C); H27(5C); H28(5C); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H35(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

149. *Pachybrachius luridus* Hahn (Lygaeidae)




A total of 8 vice-county records: 9(9k); 11(3f); 15(4t); 17(1w); 46(1w); 48(5B); 49(1w); 52(5B).

150. *Peritrechus angusticollis* (R.F. Sahlberg) (Lygaeidae)




Only one vice-county record: 9(1w).

151. *Peritrechus convivus* (Stål) (Lygaeidae)



A total of 4 vice-county records: 10(3f); 13(5h); 15(4t); 25(5f).

152. *Peritrechus geniculatus* (Hahn) (Lygaeidae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 7(6T); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(4s); 34(4s); 35(5B); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 44(2n); 45(5B); 49(5B); 51(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 63(4n); 67(7s); 69(5B); 70(5B); 71(5B).

153. *Peritrechus gracilicornis* Puton (Lygaeidae)




A total of 8 vice-county records: 1(2g); 9(1w); 10(3f); 11(7s); 12(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t).

154. *Peritrechus lundii* (Gmelin) (Lygaeidae)




A total of 58 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 40(3q); 41(1w); 45(1w); 46(5B); 49(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 75(7q); 79(10s); 81(5x); 88(5x); 95(5x); H19(3e); H20(3e).

155. *Peritrechus nubilus* (Fallén) (Lygaeidae)




A total of 33 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 24(7s); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(5B); 33(2l); 37(1w); 38(3p); 39(3p); 41(1w); 54(3o); 61(4n); 63(4n).

156. *Pionosomus varius* (Wolff) (Lygaeidae)



A total of 4 vice-county records: 9(1w); 15(4t); 41(1w); 45(1w).

157. *Plinthisus brevipennis* (Latreille) (Lygaeidae)



A total of 50 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 34(5B); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 43(1w); 45(2n); 46(2n); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 54(3o); 56(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 62(4n); 63(4n); 69(1w); 70(5B); H20(3e).

158. *Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling) (Lygaeidae)




Only one vice-county record: 1(2g).

159. *Raglius alboacuminatus* (Goeze) (Lygaeidae)




A total of 19 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 9(1w); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(9u); 25(5f); 26(5B); 27(12i); 28(4e); 29(7r); 30(7s); 41(1w).

160. *Rhyparochromus pini* (Linnaeus) (Lygaeidae)




A total of 27 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 22(1w); 23(1w); 28(4e); 30(5q); 33(8d); 34(2l); 37(1w); 38(1w); 40(1w); 41(1w); 45(1w); 49(5B).

161. *Rhyparochromus vulgaris* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 14 vice-county records: 8(9r); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(6v); 17(1w); 18(4p); 20(6H); 21(1w); 22(9j); 25(5B); 30(10d); 33(8d); 34(11g).

162. *Scolopostethus affinis* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 83 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 5(5l); 6(5l); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6d); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 49(5B); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(7s); 69(1w); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 81(5x); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 96(5B); H2(3e); H4(3e); H6(3e); H9(5C); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H17(3e); H21(3e); H37(3e); H38(5C); H39(3e); H40(5C).

163. *Scolopostethus decoratus* (Hahn) (Lygaeidae)




A total of 108 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 77(7q); 81(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 97(5B); 99(7q); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H6(3e); H9(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H36(5C); H37(3e); H38(5B); H39(5C); H40(5C).

164. *Scolopostethus grandis* Horváth (Lygaeidae)




A total of 47 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(11b); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(3p); 35(5B); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(2n); 47(5B); 48(5B); 50(5B); 51(1w); 52(5B); 53(3o); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 59(10d); 61(4n); 62(5B); 63(5B); 64(4n); 70(1w); H37(3e).

165. *Scolopostethus pictus* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 20 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 9(1w); 13(7F); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(4s); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 28(4e); 29(1w); 34(2l); 37(1w); 40(3q); 73(5x).

166. *Scolopostethus puberulus* Horváth (Lygaeidae)




A total of 46 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(7s); 6(5B); 7(9k); 9(1w); 11(4x); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 24(3p); 25(5f); 26(9h); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 40(5w); 41(5B); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 49(5B); 50(5B); 55(11b); 63(5B); H12(3e); H30(5C); H32(5C); H36(3e); H37(5C); H38(5C).

167. *Scolopostethus thomsoni* Reuter (Lygaeidae)



A total of 96 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(7s); 6(5B); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(9k); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 49(5B); 50(1w); 51(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 81(5x); 83(5x); 84(10s); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 95(5B); 96(5x); 105(5B); 106(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H6(3e); H9(3e); H12(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H28(3e); H31(3e); H33(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(3e); H40(5C).

168. *Sphragisticus nebulosus* (Fallén) (Lygaeidae)




A total of 5 vice-county records: 25(6γ); 26(5f); 27(6γ); 28(4e); 54(13g).

169. *Spilostethus pandurus* (Scopoli) (Lygaeidae)




Only one vice-county record: 15(4s).

170. *Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy) (Lygaeidae)




A total of 85 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 7(9k); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(11g); 35(5B); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 66(1w); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 81(5x); 95(5x); 96(5B); 106(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H11(3e); H12(5C); H13(3e); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H28(3e); H37(3e); H38(5B); H40(5C).

171. *Stygnocoris rusticus* (Fallén) (Lygaeidae)




A total of 77 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 64(4n); 67(5r); 68(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 76(7q); 83(5x); 85(5x); 96(5B); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H26(5C); H27(5C); H37(3e); H39(3e); H40(5C).

172. *Stygnocoris sabulosus* (Schilling) (Lygaeidae)




A total of 117 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5B); 7(6T); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(7s); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(7s); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 77(5B); 81(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(5x); 100(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H12(3e); H13(5C); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H27(3e); H30(3e); H31(5C); H32(5C); H33(5C); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5B); H39(3e); H40(5C).

173. *Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer) (Lygaeidae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(6q); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(8f); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(7r); 33(2l); 36(1w); 38(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 49(5B); 51(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 66(1w); 69(1w); 70(1w); 73(5x); 81(5x); 83(5x); H3(3e); H21(3e).

174. *Taphropeltus hamulatus* (Thomson) (Lygaeidae)




A total of 8 vice-county records: 1(2g); 3(9k); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 22(9s); 23(1w); 24(10u).

175. *Trapezonotus arenarius* (Linnaeus) (Lygaeidae)




A total of 34 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 6(5l); 9(1w); 11(3r); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(5B); 18(4p); 22(2p); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 34(2l); 40(5w); 41(1w); 44(2n); 45(1w); 48(5B); 51(1w); 52(5B); 54(3o); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 63(7s); 69(5B); 70(5B); 71(5B); H9(5C); H38(5C).

176. *Trapezonotus desertus* Seidenstücker (Lygaeidae)




A total of 47 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 11(3r); 12(3f); 13(7s); 14(7F); 15(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 22(1w); 23(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(7s); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 44(1w); 46(2n); 48(5B); 50(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 63(4n); 70(5B); 73(5x); 74(5B); 88(5x); 95(5B); 96(5x); 106(5x); 107(5x).

177. *Trapezonotus dispar* Stål (Lygaeidae)




A total of 26 vice-county records: 8(5j); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(6x); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(9h); 29(4v); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 34(2l); 38(2h); 41(5B); 54(3o); 57(3p); 58(10d).

178. *Trapezonotus ullrichi* (Fieber) (Lygaeidae)




A total of 8 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 11(10d); 22(11h); 44(1w); 45(1w).

179. *Tropistethus holosericus* (Scholtz) (Lygaeidae)




A total of 15 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(7s); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 41(5B).

180. *Xanthochilus quadratus* (Fabricius) (Lygaeidae)




A total of 4 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 49(1w); 58(5B).

181. *Berytinus clavipes* (Fabricius) (Berytidae)




A total of 27 vice-county records: 6(7s); 7(5j); 8(5A); 9(6y); 10(3f); 11(3r); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(7s); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 38(2h); 45(1w); 53(3o); H9(3e).

182. *Berytinus crassipes* (Herrich-Schaeffer) (Berytidae)




A total of 35 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 4(10y); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(8f); 28(4e); 29(1w); 30(5B); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 40(5w); 41(5B); 45(5B); 49(5B); 50(7o); 54(7s); 55(3p); 59(5d); 63(4n); 70(1w).

183. *Berytinus hirticornis* (Brullé) (Berytidae)




A total of 19 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 6(7G); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(10j); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(7s); 25(11b); 30(1w); 31(7r).

184. *Berytinus minor* (Herrich-Schaeffer) (Berytidae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 4(5o); 5(7s); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(7s); 36(6G); 37(1w); 38(1w); 40(5w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 50(7s); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(6x); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 63(5B); 69(1w); 70(1w); 71(6y); 72(5x); 85(5B); 88(5x); H3(3e); H9(5C); H15(3e); H20(5C); H22(5C); H37(5C); H38(5C); H39(3e).

185. *Berytinus montivagus* (Meyer-Dür) (Berytidae)




A total of 48 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 4(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5B); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 37(1w); 38(2h); 39(7s); 44(2n); 45(1w); 46(1w); 53(3o); 55(3p); 56(1w); 57(1w); 60(5d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 66(9C); 70(1w); H4(3e); H9(3e); H12(3e); H21(3e); H38(3e).

186. *Berytinus signoreti* (Fieber) (Berytidae)




A total of 64 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(5l); 8(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(5B); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(7s); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 49(5B); 52(1w); 54(3o); 57(7s); 58(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(5B); 67(5r); 70(1w); 73(5x); 82(5x); 83(5x); 91(5x); 95(5x); 96(5B); H1(3e); H2(3e); H6(3e); H9(3e); H16(5C); H17(3e).

187. *Gampsocoris punctipes* (Germar) (Berytidae)




A total of 59 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(2i); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 38(2h); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(1w); 54(3o); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(11f); 64(11f); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); H12(3e); H20(3e); H21(3e); H38(3e).

188. *Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer) (Berytidae)




A total of 71 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(6y); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 48(5B); 49(5B); 52(5B); 54(3o); 55(5B); 57(5B); 58(5B); 59(10d); 60(10d); 61(11f); 62(11f); 63(4n); 66(1w); H1(5C); H2(3e); H3(3e); H9(3e); H12(3e); H13(5C); H16(3e); H18(3e); H19(3e); H20(5C); H22(3e); H25(5C); H29(3e); H33(3e); H37(5C); H38(3e).

189. *Neides tipularius* (Linnaeus) (Berytidae)




A total of 39 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(7s); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 34(5B); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 48(1w); 52(1w); 54(7s); 56(1w); 59(5d); 60(5d); 63(4n); 69(5B); 70(1w); H21(3e); H38(3e).

190. *Parapiesma quadratum* (Fieber) (Piesmatidae)




A total of 59 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(6x); 18(4p); 19(4p); 21(1w); 22(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 32(7r); 38(2h); 40(4s); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(12i); 54(3o); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(4n); 63(5B); 66(1w); 69(5B); 70(1w); 71(5d); 85(5x); 89(5x); 91(5x); 96(5B); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H9(3e); H12(3e); H21(3e); H27(3e); H38(5C); H39(5C).

191. *Piesma maculatum* (Laporte) (Piesmatidae)




A total of 53 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 8(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(3p); 33(2l); 34(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 49(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 96(5B); 106(5x); H20(3e).

192. *Acalypta brunnea* (Germar) (Tingidae)




A total of 39 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5l); 9(1w); 11(3f); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 30(5q); 38(1w); 40(1w); 45(2n); 48(1w); 60(10d); 62(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5r); 69(5B); 70(5B); 83(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 104(5B); 105(5x); 106(5x); H2(3e); H7(7s); H16(3e); H21(3e); H27(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(5C); H39(5C).

193. *Acalypta carinata* (Panzer) (Tingidae)




A total of 57 vice-county records: 5(7s); 7(5j); 9(1w); 11(3f); 12(3g); 13(7F); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(5B); 34(2l); 36(1w); 38(1w); 40(1w); 41(1w); 43(5B); 44(2n); 48(5B); 49(5B); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 60(10d); 62(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5r); 69(5B); 70(1w); 73(5x); 77(5B); 80(5x); 83(5x); 88(5x); 89(5x); 105(5x); 111(5B); H2(3e); H6(3e); H16(3e); H21(3e); H27(3e); H33(7s); H37(3e); H39(3e).

194. *Acalypta nigrina* (Fallén) (Tingidae)




A total of 18 vice-county records: 6(5l); 15(5B); 39(1w); 49(1w); 60(5d); 62(6O); 68(5r); 73(5x); 85(5x); 88(5x); 92(5x); 94(5B); 95(5x); 96(5x); 104(5x); 105(5x); 107(5B); 108(5x).

195. *Acalypta parvula* (Fallén) (Tingidae)




A total of 91 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(2j); 33(7s); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 48(1w); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(10d); 62(4n); 63(4n); 65(4n); 67(5r); 68(5B); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 83(5x); 85(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 97(9h); 104(5x); 105(5B); 106(5B); 107(5B); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H4(5C); H5(5C); H6(3e); H15(5C); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H34(3e); H35(3e); H37(3e); H38(5B); H39(3e).

196. *Acalypta platycheila* (Fieber) (Tingidae)




A total of 8 vice-county records: 9(1w); 13(5h); 16(4t); 17(4f); 23(1w); 26(5f); 27(4e); 39(1w).

197. *Agramma laetum* (Fallén) (Tingidae)




A total of 44 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(7s); 6(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(2i); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 38(1w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 48(5B); 49(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 56(5B); 59(5d); 60(5d); 63(10d); 69(1w); 70(1w).

198. *Campylosteira verna* (Fallén) (Tingidae)



A total of 33 vice-county records: 1(2g); 2(5B); 5(5B); 6(7s); 7(8h); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(5B); 33(2l); 38(2h); 42(5B); 49(5B); 54(3o); 61(4n); 62(5r); 63(10d); 66(7s); 67(5r).

199. *Catoplatus fabricii* (Stål) (Tingidae)




A total of 27 vice-county records: 1(2g); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 41(1w); 55(3p); 63(4n).

200. *Corythucha ciliata* (Say) (Tingidae)




Only one vice-county record: 30(1w).

201. *Derephysia foliacea* (Fallén) (Tingidae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(7x); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(10j); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(5B); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 48(1w); 49(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(8h); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(10d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(5r); 70(1w); 72(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); H2(3e); H9(5C); H16(3e); H21(3e); H27(3e).

202. *Dictyla convergens* (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)




A total of 65 vice-county records: 1(2g); 3(5B); 7(8h); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(2n); 46(5B); 49(5B); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(10d); 63(4n); 64(4n); 70(1w); 89(5x); H4(5C); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H36(5C); H37(5C); H38(5C).

203. *Dictyonota fuliginosa* A. Costa (Tingidae)




A total of 21 vice-county records: 10(6y); 11(3r); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 38(2h); 54(3o); 56(5B); 63(10d).

204. *Dictyonota strichnocera* Fieber (Tingidae)




A total of 58 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(8h); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 49(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 63(4n); 66(8h); 69(5B); 70(1w); 95(5x).

205. *Kalama tricornis* (Schränk) (Tingidae)




A total of 53 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(8h); 8(8h); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 34(11g); 35(5B); 36(1w); 38(2h); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 48(1w); 52(1w); 54(3o); 55(11b); 56(1w); 61(4n); 62(4n); 63(7s); 67(7s); 70(1w); 83(5x); H6(3e); H9(3e); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H34(3e); H37(3e).

206. *Lasiacantha capucina* (Germar) (Tingidae)




A total of 3 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 45(1w).

207. *Oncochila simplex* (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)




A total of 10 vice-county records: 10(3f); 11(3f); 13(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 22(1w); 24(1w); 33(2l); 34(2l).

208. *Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer) Aggregate (Tingidae)




A total of 51 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(4y); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(3p); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 50(6f); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(3p); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(6V); 63(4n); 64(4n).

209. *Physatocheila harwoodi* China (Tingidae)




Only one vice-county record: 9(1w).

210. *Physatocheila smreczynskii* China (Tingidae)




A total of 12 vice-county records: 1(12o); 2(2g); 3(5o); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(7F); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 22(1w).

211. *Stephanitis rhododendri* Horváth (Tingidae)




A total of 29 vice-county records: 3(6Z); 6(6Z); 8(6Z); 9(1w); 11(6Z); 12(6Z); 13(6Z); 14(6Z); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(6Z); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 24(1w); 25(6Z); 27(6Z); 28(6Z); 36(1w); 37(1w); 41(1w); 54(6Z); 55(1w); 58(1w); 61(6Z); 67(6Z); 83(6Z).

212. *Stephanitis takeyai* Drake & Maa (Tingidae)




A total of 19 vice-county records: 2(12k); 3(10y); 11(3r); 12(4x); 13(7F); 14(7F); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(6h); 23(1w); 28(9h); 33(8d); 37(60); 41(5B); 50(9l); 58(10d); 59(10d); 63(4n).

213. *Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)




A total of 59 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 5(5l); 6(5l); 7(6r); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(3p); 41(1w); 44(5B); 45(5B); 46(2n); 47(5B); 49(5B); 50(6f); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 59(5B); 60(5d); 61(4n); 62(5B); 63(4n); 64(4n); 65(4n).

214. *Tingis angustata* (Herrich-Schaeffer) (Tingidae)




A total of 5 vice-county records: 13(5h); 14(7F); 16(4t); 19(5f); 20(1w).

215. *Tingis cardui* (Linnaeus) (Tingidae)




A total of 114 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 75(5B); 78(10n); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H4(5C); H5(5C); H6(5C); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H13(5C); H14(3e); H19(5C); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H26(5C); H27(5C); H31(5C); H33(5C); H34(3e); H37(3e); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

216. *Tingis reticulata* Herrich-Schaeffer (Tingidae)




A total of 23 vice-county records: 5(5l); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 28(4e); 29(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 36(1w); 38(2h); 41(5B); 62(4n).

217. *Coranus aethiops* Jakovlev (Reduviidae)




A total of 2 vice-county records: 56(9y); 63(4n).

218. *Coranus subapterus* (De Geer) (Reduviidae)




A total of 18 vice-county records: 9(8h); 11(8h); 12(8h); 13(7F); 14(7F); 17(1w); 26(8f); 27(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 40(4s); 41(8h); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 52(1w); 58(1w).

219. *Coranus woodroffei* P.V. Putshkov (Reduviidae)




A total of 11 vice-county records: 11(3r); 14(7s); 15(7x); 17(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 41(5B); 52(5B); 54(3o); 70(5B).

220. *Empicoris baerensprungi* (Dohrn) (Reduviidae)




A total of 13 vice-county records: 11(3f); 12(3f); 13(7F); 15(5B); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 29(7r); 30(1w); 31(1w); 32(7s); 33(2l); 53(3o).

221. *Empicoris culiciformis* (De Geer) (Reduviidae)




A total of 45 vice-county records: 8(6y); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(1w); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 46(1w); 54(3o); 55(6y); 56(1w); 58(1w); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 83(5x); 88(5x); 89(5x); H21(3e); H37(3e).

222. *Empicoris rubromaculatus* (Blackburn) (Reduviidae)




A total of 6 vice-county records: 13(7F); 14(7F); 17(7A); 20(7A); 22(10d); 30(7A).

223. *Empicoris vagabundus* (Linnaeus) (Reduviidae)




A total of 77 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 6(6Z); 7(8h); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6q); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 45(2n); 46(2n); 50(1w); 51(6f); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(10d); 67(5r); 68(5r); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 81(5B); 82(5B); 85(5B); 88(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5x); 106(5x); 107(5B); H1(3e); H3(3e); H6(3e); H14(3e); H19(3e); H21(3e); H33(5C); H38(5C).

224. *Oncocephalus pilicornis* Reuter (Reduviidae)




Only one vice-county record: 37(1w).

225. *Pygolampus bidentata* (Goeze) (Reduviidae)




A total of 3 vice-county records: 3(6y); 11(3f); 40(1w).

226. *Reduvius personatus* (Linnaeus) (Reduviidae)




A total of 38 vice-county records: 1(2g); 6(5l); 7(5j); 11(3f); 12(12o); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 50(7o); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d).

227. *Himacerus apterus* (Fabricius) (Nabidae)




A total of 51 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(1w); 41(5B); 45(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(5B); 58(10d); 59(10d); 60(5d); 61(4n); 62(6z); 63(4n); 64(4n); 76(7q).

228. *Himacerus boops* (Schiodte) (Nabidae)




A total of 35 vice-county records: 3(10y); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(7F); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(3q); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 38(2h); 41(5B); 52(5B); 54(3o); 61(4n); 63(4n); H16(3e).

229. *Himacerus major* (A. Costa) (Nabidae)




A total of 79 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(10d); 65(4n); 68(5B); 69(5B); 70(1w); 73(5B); 76(7q); 85(5x); 91(5B); 96(5B); H1(3e); H5(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H38(5C).

230. *Himacerus mirmicoides* (O. Costa) (Nabidae)



A total of 80 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(6T); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 60(10d); 61(5B); 63(4n); 66(1w); 70(5B); 73(5x); 76(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H16(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H37(3e); H39(5C); H40(3e).

231. *Nabis brevis* Scholtz (Nabidae)




A total of 12 vice-county records: 1(2g); 14(7F); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 20(2o); 27(4e); 28(4e); 34(5B); 39(1w); 62(10d); 63(4n).

232. *Nabis capsiformis* Germar (Nabidae)




Only one vice-county record: 1(3q).

233. *Nabis ericetorum* Scholtz (Nabidae)




A total of 92 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 31(6δ); 34(2l); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(5B); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 52(1w); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(10d); 67(5B); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(7q); 77(7q); 87(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 98(7q); 103(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5B); 107(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H11(3e); H13(3e); H14(5C); H16(5C); H17(3e); H18(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H33(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H40(5C).

234. *Nabis ferus* (Linnaeus) (Nabidae)




A total of 96 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(60); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(7s); 68(5r); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 77(7q); 81(5x); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 97(5x); 99(7q); 100(5x); 102(5x); 104(5x); 106(5B); 110(5x); 112(9y); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H12(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H27(3e); H37(3e); H38(5C).

235. *Nabis flavomarginatus* Scholtz (Nabidae)




A total of 125 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5o); 5(7s); 6(5l); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(10s); 77(5x); 78(9h); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5B); 91(8g); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 99(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5B); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H24(3e); H25(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H37(3e); H38(5C); H39(3e).

236. *Nabis limbatus* Dahlbom (Nabidae)




A total of 136 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(9h); 81(5x); 83(10n); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(8g); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 98(5B); 99(5x); 100(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5B); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H10(5C); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H14(3e); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H24(3e); H25(3e); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(3e); H31(3e); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(3e); H40(3e).

237. *Nabis lineatus* Dahlbom (Nabidae)




A total of 55 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 5(7s); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 31(6δ); 32(7r); 38(3p); 39(5B); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 49(5B); 52(1w); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 59(5B); 60(10d); 61(4n); 63(4n); 67(5B); 70(5B); 88(5x); 95(5B); 96(5B); H1(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H12(5C); H15(5C); H16(5C); H20(3e); H36(5C); H38(5C).

238. *Nabis pseudoferus* Remane (Nabidae)




A total of 16 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 4(5o); 6(5B); 9(1w); 11(3f); 14(7F); 15(4t); 18(7s); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 45(1w); 53(3o); 70(5B).

239. *Nabis rugosus* (Linnaeus) (Nabidae)




A total of 101 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(7s); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 69(5B); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 81(5x); 88(5x); 95(5x); 96(5B); 104(5x); 106(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H31(3e); H33(5C); H35(5C); H37(3e); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

240. *Prostemma guttula* (Fabricius) (Nabidae)




A total of 4 vice-county records: 15(4t); 16(4t); 25(7x); 49(1w).

241. *Acompocoris alpinus* Reuter (Anthocoridae)



A total of 37 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 11(6y); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(3h); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 32(7r); 33(5B); 35(5B); 36(1w); 38(2h); 40(5B); 54(3o); 58(1w); 60(5d); 65(4n); 70(5B); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); H2(3e).

242. *Acompocoris pygmaeus* (Fallén) (Anthocoridae)




A total of 82 vice-county records: 3(10y); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6q); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 44(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 52(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(7q); 77(7q); 82(5B); 83(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); H2(3e); H8(3e); H10(5C); H12(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H29(3e); H37(5C); H38(3e); H39(5C).

243. *Amphiareus constrictus* (Stål) (Anthocoridae)




Only one vice-county record: 16(4t).

244. *Anthocoris amplicollis* Horváth (Anthocoridae)




A total of 10 vice-county records: 17(1w); 22(7s); 23(1w); 26(5f); 28(10n); 31(7r); 32(1w); 34(7s); 36(7s); 62(4n).

245. *Anthocoris butleri* Le Quesne (Anthocoridae)




A total of 20 vice-county records: 7(6y); 10(3f); 16(4t); 17(1w); 20(5D); 22(1w); 23(1w); 27(9h); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 38(3p); 40(1w); 61(10d); 62(4n); 63(4n); H20(3e).

246. *Anthocoris confusus* Reuter (Anthocoridae)




A total of 111 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 5(5l); 6(5B); 7(7s); 8(10r); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 78(10s); 81(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 99(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5B); 107(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H31(5C); H33(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C); H40(5B).

247. *Anthocoris gallarumulmi* (De Geer) (Anthocoridae)




A total of 43 vice-county records: 7(5j); 9(1w); 11(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5B); 27(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(7s); 34(2l); 36(1w); 38(2h); 41(1w); 49(1w); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 60(8i); 61(4n); 62(10d); 63(4n); 64(4n); 69(5B); 70(1w); 81(5x); 88(5x); 92(5x); 96(5B); 99(6Z); 106(5x); H21(3e).

248. *Anthocoris limbatus* Fieber (Anthocoridae)




A total of 33 vice-county records: 1(2g); 6(5B); 11(3f); 12(10j); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(7s); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 38(3p); 49(5B); 54(3o); 63(4n); 64(10d); 66(5r); 67(5r); H2(3e); H19(3e); H22(3e); H36(5C); H37(3e); H40(7s).

249. *Anthocoris minki* Dohrn (Anthocoridae)




A total of 16 vice-county records: 12(6m); 14(7F); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(7s); 21(6m); 22(3t); 23(3t); 24(1w); 29(3v); 30(1w); 32(7r); 60(10d); 61(5t); 63(10d).

250. *Anthocoris nemoralis* (Fabricius) (Anthocoridae)




A total of 126 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 4(10y); 5(6S); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(7s); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(7s); 75(5B); 76(7q); 79(10s); 80(5B); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(10s); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 94(5B); 95(5B); 96(5B); 97(5B); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 109(5B); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(5C); H12(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(5C); H24(5C); H27(3e); H28(3e); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(5C); H40(3e).

251. *Anthocoris nemorum* (Linnaeus) (Anthocoridae)




A total of 144 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5A); 4(5B); 5(5I); 6(5I); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5x); 78(9h); 80(5B); 81(5x); 82(9h); 83(5x); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5B); 92(5x); 93(5B); 94(5B); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 109(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H10(3e); H12(3e); H13(5C); H14(3e); H15(5C); H16(3e); H17(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(5C); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(5C); H40(5B).

252. *Anthocoris pilosus* (Jakovlev) (Anthocoridae)




A total of 2 vice-county records: 54(3o); 110(5x).

253. *Anthocoris sarothamni* Douglas & Scott (Anthocoridae)




A total of 53 vice-county records: 9(1w); 11(3r); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(7s); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 44(1w); 48(1w); 52(1w); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 60(10d); 61(5B); 62(4n); 63(5B); 67(5r); 68(5r); 70(1w); 71(5d); 85(5x); 86(6Z); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 96(5B); 105(5B); 106(5x); 107(5B); H20(3e).

254. *Anthocoris simulans* Reuter (Anthocoridae)




A total of 40 vice-county records: 13(7F); 14(7F); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(10n); 29(4v); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 34(5B); 35(5B); 38(2h); 40(5w); 41(5B); 53(3o); 58(5B); 59(10d); 61(4n); 62(10d); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 70(5B); 96(5B); 106(5B); 108(5B); H1(3e); H3(3e); H9(3e); H37(5C); H38(5C).

255. *Anthocoris visci* Douglas (Anthocoridae)




A total of 23 vice-county records: 2(2g); 3(8h); 5(8h); 9(1w); 11(8h); 12(9q); 14(7F); 16(4t); 17(4y); 21(4y); 22(10q); 23(2q); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 33(5B); 34(8h); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(3p); 40(5w); 50(8h).

256. *Brachysteles parvicornis* (A. Costa) (Anthocoridae)




A total of 15 vice-county records: 9(1w); 10(3f); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(7s); 18(7s); 20(1w); 22(7s); 25(5f); 29(4v); 30(1w); 32(7r); 45(2n); 61(10d).

257. *Buchananiella continua* (F.B. White) (Anthocoridae)




A total of 41 vice-county records: 1(7s); 2(5B); 3(5o); 6(5l); 11(3r); 13(5h); 14(7F); 15(7s); 16(7s); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(2q); 24(7s); 26(5f); 27(10n); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(7s); 37(1w); 38(3p); 40(5w); 41(11f); 53(3o); 54(3o); 58(1w); 59(10d); 60(10d); 61(4n); 62(6O); 63(4n); H37(10d).

258. *Cardiastethus fasciiventris* (Garbiglietti) (Anthocoridae)




A total of 41 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5l); 7(7s); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(6q); 13(6t); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(3q); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(7s); 37(5B); 38(3p); 40(5w); 41(1w); 54(3o); 55(9h); 56(7s); 58(10d); 61(6O); 62(6O).

259. *Dufouriellus ater* (Dufour) (Anthocoridae)




A total of 34 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 11(3r); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 53(3o); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 61(4n); 63(10d); H38(3e).

260. *Elatophilus nigricornis* (Zetterstedt) (Anthocoridae)




A total of 29 vice-county records: 8(5j); 11(3f); 12(10j); 13(7F); 14(7F); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 30(1w); 33(2l); 34(2l); 60(5d); 61(6O); 62(4n); 64(4n); 70(5B); 72(5B); 81(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 105(7s); 106(5x).

261. *Lyctocoris campestris* (Fabricius) (Anthocoridae)




A total of 70 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5l); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 46(1w); 49(1w); 52(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 78(5x); 83(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 104(5x); 106(5B); H2(3e); H6(3e); H12(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H33(5C); H34(3e); H37(5C); H39(3e).

262. *Orius horvathi* (Reuter) (Anthocoridae)




A total of 4 vice-county records: 27(9h); 29(7r); 32(3q); 58(10d).

263. *Orius laevigatus* (Fieber) (Anthocoridae)




A total of 55 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(6S); 6(5B); 7(11e); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(10j); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(4f); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(5B); 30(1w); 31(6ð); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(6y); 37(6ø); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(5B); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 49(5B); 50(6y); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 58(10d); 59(10d); 60(10d); 61(4n); 63(4n); H2(3e); H6(5C); H12(3e); H19(3e); H27(5C).

264. *Orius laticollis* (Reuter) (Anthocoridae)




A total of 33 vice-county records: 3(10y); 10(3f); 11(3f); 12(10j); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 29(4v); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 38(3p); 42(5B); 53(3o); 54(3o); 59(10d); 60(10d); 61(10d); 62(10d); 63(4n); 64(10d); H6(5C); H9(3e); H25(5C); H37(5C).

265. *Orius majusculus* (Reuter) (Anthocoridae)




A total of 57 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 5(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(10j); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(5B); 43(5B); 49(1w); 50(5B); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 84(10s); H19(3e); H33(5C); H34(5C); H38(3e); H40(5C).

266. *Orius niger* (Wolff) (Anthocoridae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6q); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 49(1w); 50(5B); 51(1w); 53(3o); 54(3o); 55(9h); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(10d); 70(5B); H25(5C).

267. *Orius vicinus* (Ribaut) (Anthocoridae)




A total of 49 vice-county records: 3(10y); 6(5B); 9(1w); 11(3r); 12(10j); 13(7F); 14(5B); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(5s); 24(7s); 25(5B); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(7s); 37(5B); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 49(5B); 50(6f); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(6c); 63(5B); 70(5B); H2(5C); H19(5C); H37(5C).

268. *Temnostethus gracilis* Horváth (Anthocoridae)




A total of 94 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(6S); 7(7s); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 19(7s); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(5B); 38(2h); 40(5w); 41(5B); 42(5B); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 47(1w); 49(1w); 54(3o); 55(1w); 57(5B); 58(5B); 60(5d); 61(10d); 62(4n); 63(10d); 64(10d); 65(4n); 67(5B); 69(1w); 70(5B); 72(5x); 73(5x); 75(5x); 76(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 99(5x); 100(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5B); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H5(3e); H12(3e); H16(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H36(5C); H37(5C); H38(3e); H39(3e).

269. *Temnostethus pusillus* (Herrich-Schaeffer) (Anthocoridae)




A total of 54 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 9(10x); 10(3f); 11(7s); 12(3f); 13(7s); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(5D); 22(1w); 23(5s); 24(7s); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 37(7s); 38(2h); 40(5w); 41(5B); 44(1w); 46(2n); 53(3o); 55(7s); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 62(4n); 63(5B); 64(4n); 70(5B); 81(5x); 85(5x); 95(5B); 96(5x); 104(5x); 106(5B); 110(5x); H2(3e); H15(3e); H31(3e); H33(5C).

270. *Temnostethus tibialis* Reuter (Anthocoridae)




A total of 5 vice-county records: 12(3f); 16(4t); 22(1w); H3(5C); H19(3e).

271. *Tetraphleps bicuspis* (Herrich-Schaeffer) (Anthocoridae)




A total of 57 vice-county records: 3(5o); 5(5l); 9(1w); 11(3f); 13(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 30(1w); 32(1w); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 48(1w); 50(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 70(1w); 72(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 105(5B); 106(5x); H2(3e); H6(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e).

272. *Xylocoridea brevipennis* Reuter (Anthocoridae)




A total of 10 vice-county records: 6(5l); 9(1w); 16(4t); 17(1w); 20(2o); 22(1w); 25(5f); 36(7s); 40(5w); 41(1w).

273. *Xylocoris cursitans* (Fallén) (Anthocoridae)




A total of 60 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 7(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 44(2n); 45(1w); 46(2n); 47(5B); 50(1w); 53(3o); 54(3o); 55(12i); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(10d); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 69(1w); 70(1w); 80(5x); 83(5x); H21(5C).

274. *Xylocoris flavipes* Reuter (Anthocoridae)




A total of 4 vice-county records: 17(8c); 18(8c); 21(8c); 44(8c).

275. *Xylocoris formicetorum* (Boheman) (Anthocoridae)




A total of 5 vice-county records: 16(4t); 35(1w); 88(5x); 92(5x); 96(5x).

276. *Xylocoris galactinus* (Fieber) (Anthocoridae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(6x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(10n); 29(4v); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 55(1w); 58(1w); 59(5d); 61(10d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 70(1w); 88(5x); H2(3e); H12(3e); H21(3e).

277. *Cimex columbarius* Jenyns (Cimicidae)




A total of 8 vice-county records: 17(1w); 19(6Z); 29(1w); 32(1w); 40(1w); 54(3o); 56(1w); 64(10d).

278. *Cimex lectularius* Linnaeus (Cimicidae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 3(6y); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(4f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 32(1w); 36(1w); 38(1w); 39(1w); 41(1w); 49(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(6Z); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(10d); 66(1w); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 77(5x); 88(5x); 95(5x); 104(5B); 105(5B); H6(3e); H8(3e); H21(3e); H22(5C); H28(5C); H31(5C); H37(3e); H39(3e).

279. *Cimex pipistrelli* Jenyns (Cimicidae)




A total of 31 vice-county records: 9(1w); 11(6y); 15(4t); 17(5B); 18(4p); 20(3h); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 29(1w); 33(2l); 36(1w); 37(1w); 39(5B); 41(5B); 47(5B); 49(5B); 52(5B); 56(1w); 61(10d); 63(10d); 65(10d); 70(5B); 76(5x); 88(5x); H5(3e); H6(3e); H17(3e); H39(3e); H40(5C).

280. *Oeciacus hirundinis* (Lamarck) (Cimicidae)




A total of 25 vice-county records: 5(5l); 6(5l); 8(5j); 10(3f); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 38(2h); 53(3o); 55(5y); H37(3e).

281. *Loricula coleoprata* (Fallén) (Microphysidae)




A total of 15 vice-county records: 1(2g); 16(4t); 17(4f); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5A); 28(4e); 30(1w); 31(1w); 54(3o); 62(10d); 69(1w).

282. *Loricula distinguenda* (Reuter) (Microphysidae)




A total of 37 vice-county records: 2(12o); 4(5B); 11(3f); 12(10j); 13(7s); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(3h); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(11f); 31(7r); 35(5B); 40(1w); 45(2n); 51(5B); 52(5B); 56(1w); 58(10d); 61(10d); 62(10d); 63(10d); 64(5B); 68(5r); 70(5B); 72(5x); 88(5x); 96(5x).

283. *Loricula elegantula* (Baerensprung) (Microphysidae)




A total of 82 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(5B); 48(1w); 49(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(10d); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(5B); 83(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 96(5x); 104(5x); 106(5x); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H6(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H33(5C); H37(5C); H39(3e).

284. *Loricula exilis* (Fallén) (Microphysidae)




A total of 50 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 9(1w); 11(3r); 12(10j); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 37(1w); 39(1w); 44(1w); 47(5B); 49(1w); 52(5B); 56(5B); 58(1w); 60(10d); 63(10d); 64(4n); 70(5B); 81(11b); 88(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); H1(5C); H2(3e); H11(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H27(3e); H33(5C).

285. *Loricula inconspicua* (Douglas & Scott) (Microphysidae)




A total of 8 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 9(1w); 10(3f); 14(5h); 25(5f); 63(10d); H12(3e).

286. *Loricula pselaphiformis* Curtis (Microphysidae)




A total of 69 vice-county records: 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(8f); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 33(7s); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 46(2n); 48(5B); 49(5B); 50(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 83(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 94(5B); 95(5x); 96(5x); 104(5x); 106(5x); 110(5x); H21(5C); H33(5C); H37(5C); H38(3e); H39(5C).

287. *Loricula ruficeps* (Reuter) (Microphysidae)




Only one vice-county record: 3(5o).

288. *Acetropis gimmerthalii* (Flor) (Miridae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 5(5l); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 34(2l); 35(5B); 36(6G); 37(1w); 38(2h); 40(1w); 41(5B); 42(5B); 53(3o); 54(3o); 57(1w); 59(10d); 61(4n); 62(11f); 63(11f); H24(3e).

289. *Adelphocoris lineolatus* (Goeze) (Miridae)




A total of 86 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(6f); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(7s); 66(5r); 67(5r); 68(5B); 69(5B); 70(1w); 75(5B); 77(5x); 81(5x); 82(5B); 85(5x); 88(5x); 90(5x); 91(5B); 96(5B); H1(3e); H2(3e); H9(3e); H10(5C); H11(3e); H12(5C); H15(5C); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H26(5C); H27(5C); H33(5C); H38(5C).

290. *Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 3 vice-county records: 14(5t); 17(5t); 41(5t).

291. *Adelphocoris seticornis* (Fabricius) (Miridae)




A total of 24 vice-county records: 3(5o); 4(5o); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 27(4e); 28(4e); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 61(4n); 81(5x); 89(5x); H5(3e); H6(3e); H7(5C); H9(5C); H10(5C); H12(3e); H19(5C).

292. *Adelphocoris ticinensis* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 17 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(7s); 15(5B); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 31(6δ); 38(5B).

293. *Agnocoris reclairei* (Wagner) (Miridae)




A total of 22 vice-county records: 14(5h); 16(6C); 17(6C); 18(4p); 20(3w); 22(1w); 23(1w); 24(3w); 26(5f); 27(4e); 29(1w); 30(5q); 31(1w); 32(7r); 33(2l); 37(6θ); 38(1w); 55(9h); 57(3p); 61(11f); 63(11f); 69(1w).

294. *Alloeotomus germanicus* Wagner (Miridae)




A total of 2 vice-county records: 13(10o); 14(10o).

295. *Alloeotomus gothicus* (Fallén) (Miridae)




A total of 36 vice-county records: 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(2o); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(2i); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(5q); 32(7r); 33(2l); 35(5B); 37(1w); 38(1w); 40(5w); 53(3o); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(11f); 62(11f); 63(5B); 64(11f).

296. *Amblytylus brevicollis* Fieber (Miridae)




A total of 17 vice-county records: 11(3r); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(5f); 28(4e); 57(1w); 65(4n); 69(5B); 72(5x); 89(5x); 90(5x).

297. *Amblytylus delicatus* (Perris) (Miridae)




A total of 9 vice-county records: 9(1w); 17(1w); 18(4p); 22(6i); 25(5B); 28(6N); 29(7r); 30(5q); 31(7r).

298. *Amblytylus nasutus* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 48 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6d); 32(1w); 33(7s); 34(2l); 35(5B); 37(6o); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 53(3o); 54(3o); 55(10n); 56(3p); 57(1w); 58(10d); 59(10d); 61(6O); 62(11f); 63(4n); 67(5B).

299. *Apolygus limbatus* (Fallén) (Miridae)




Only one vice-county record: 17(1w).

300. *Apolygus lucorum* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 91 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6q); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5B); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(6θ); 38(1w); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(6f); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(7s); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 83(5B); 85(5B); 88(5x); 96(5x); 105(5B); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H11(3e); H12(5C); H20(3e); H21(3e); H27(5C); H29(3e); H31(3e); H33(5C); H37(5C); H38(5C).

301. *Apolygus spinolae* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 81 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(1w); 32(1w); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 49(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4w); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 68(5r); 69(5B); 70(5B); 81(5x); 91(8g); 92(5x); 95(12m); 96(5x); 97(9h); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H5(3e); H7(3e); H9(3e); H12(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H27(5C); H29(3e); H33(5C); H38(5C).

302. *Asciodema obsoleta* (Fieber) (Miridae)




A total of 98 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 5(5I); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(6t); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(11b); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 83(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(11d); 96(5x); 99(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H12(3e); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H27(5C); H28(3e); H33(5C); H35(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

303. *Atractotomus magnicornis* (Fallén) (Miridae)




A total of 63 vice-county records: 3(5o); 5(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 29(1w); 30(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5B); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 106(5x); H2(3e); H6(3e); H12(3e); H21(3e).

304. *Atractotomus mali* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 50 vice-county records: 3(10y); 4(10y); 6(5l); 7(7s); 8(5j); 9(6y); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(5B); 49(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 60(10d); 61(11f); 62(6O); 63(4n); 64(11f); 65(11f).

305. *Atractotomus parvulus* Reuter (Miridae)




A total of 31 vice-county records: 1(2g); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(4j); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 32(7r); 33(11f); 38(2h); 40(5w); 53(3o); 56(5B); 59(10d); 61(11f); 63(11f); 82(5B); 89(5x); 92(5B); 96(5B); 106(5x).

306. *Blepharidopterus angulatus* (Fallén) (Miridae)




A total of 117 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 77(6Z); 78(11b); 81(5x); 83(5B); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(9h); 99(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H13(5C); H16(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H27(3e); H28(5C); H33(5C); H34(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

307. *Blepharidopterus diaphanus* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 41 vice-county records: 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(10z); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 38(2h); 39(1w); 44(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(6c); 63(4n); 64(11f); 99(10d); H37(10d).

308. *Bothynotus pilosus* (Boheman) (Miridae)




A total of 20 vice-county records: 3(5o); 14(5h); 15(4t); 22(1w); 27(4e); 28(4e); 39(1w); 64(4n); 70(1w); 72(5x); 85(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 99(5x); 104(5B); 105(9i); 111(5B); H9(3e).

309. *Brachyarthrum limitatum* Fieber (Miridae)




A total of 21 vice-county records: 6(5B); 9(1w); 11(3r); 12(4x); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 37(6θ); 38(1w); 57(5B); 63(4n).

310. *Brachynotocoris puncticornis* Reuter (Miridae)




A total of 9 vice-county records: 13(8o); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 30(1w); 32(7r); 33(2l); 63(11f).

311. *Bryocoris pteridis* (Fallén) (Miridae)




A total of 90 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(9h); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(60); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5x); 77(7q); 81(5x); 83(5B); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 99(5x); 104(5x); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H9(3e); H13(5C); H20(3e); H21(3e); H28(3e); H29(5C); H33(5C); H38(5C); H40(5C).

312. *Calocoris alpestris* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 40 vice-county records: 6(5B); 7(5j); 8(6d); 20(2o); 23(1w); 27(4e); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(3q); 37(1w); 38(3p); 39(1w); 40(3p); 47(5B); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 53(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 83(8i); 96(5B).

313. *Calocoris roseomaculatus* (De Geer) (Miridae)




A total of 96 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5l); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 44(2n); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 50(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(7s); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 75(5B); 76(7q); 81(5x); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 109(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(5C); H12(3e); H14(3e); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(5C); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H27(3e); H28(3e); H31(3e); H37(3e); H39(3e).

314. *Camptozygum aequale* (Villers) (Miridae)




A total of 49 vice-county records: 9(1w); 11(4x); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(10n); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 34(2l); 36(1w); 38(2h); 39(1w); 41(1w); 44(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 70(1w); 72(5x); 85(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 105(5B); H2(3e); H6(3e).

315. *Campylomma annulicorne* (Signoret) (Miridae)




A total of 20 vice-county records: 7(8d); 10(3f); 11(10B); 12(10z); 15(5B); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(2i); 23(1w); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 38(3p); 40(5w); 61(11f); 63(11f).

316. *Campylomma verbasci* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 19 vice-county records: 9(5B); 11(10B); 13(8o); 15(7B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(9s); 23(7I); 24(4f); 28(4e); 29(3p); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 55(11b); 63(11f).

317. *Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 100 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(5B); 50(6f); 51(8j); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4w); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5B); 69(5B); 70(1w); 73(5x); 77(5B); 81(11b); 82(5x); 83(10n); 85(5B); 95(10k); 96(5B); 99(7q); 104(5x); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(5C); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H15(3e); H16(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H27(3e); H31(3e); H33(5C); H37(3e); H38(3e).

318. *Capsodes flavomarginatus* (Donovan) (Miridae)




A total of 13 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 11(3f); 13(7F); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 20(3z); 22(1w); 25(5f); 38(2h); 39(1w).

319. *Capsodes gothicus* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 37 vice-county records: 3(5o); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 32(1w); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 38(1w); 39(1w); 41(1w); 45(1w); 46(1w); 54(3o); 56(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 66(1w); 67(5r); 70(1w).

320. *Capsodes sulcatus* (Fieber) (Miridae)




A total of 10 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(7F); 58(1w).

321. *Capsus ater* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 130 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(3p); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 77(5B); 80(5B); 81(5x); 82(5B); 83(5x); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 91(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 99(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H15(3e); H16(5C); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H32(3e); H33(5C); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

322. *Capsus wagneri* (Remane) (Miridae)




A total of 23 vice-county records: 6(5l); 9(1w); 10(3f); 13(5h); 21(1w); 22(7s); 23(4h); 27(4e); 28(10n); 29(1w); 31(1w); 32(1w); 33(8d); 34(2l); 53(3o); 55(10n); 56(4s); 61(4n); 63(11f); 64(4n); 67(5r); 72(5x); 104(5x).

323. *Charagochilus gyllenhalii* (Fallén) (Miridae)




A total of 76 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5o); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(6x); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(3q); 41(5B); 42(5B); 45(1w); 48(1w); 50(7o); 52(5B); 55(13g); 56(1w); 57(4n); 58(1w); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 81(5x); 83(9h); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 105(5B); 106(5x); 107(5x); H1(3e); H2(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H12(5C); H13(5C); H15(3e); H16(5C); H17(5C); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H38(5C).

324. *Charagochilus weberi* Wagner (Miridae)




A total of 3 vice-county records: 12(3f); 20(2o); 23(9B).

325. *Chlamydatius evanescens* (Boheman) (Miridae)




A total of 35 vice-county records: 7(5j); 8(5t); 11(3f); 12(3g); 13(5t); 15(7B); 16(7s); 17(4y); 18(4p); 19(4p); 20(3q); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(6N); 28(4e); 29(7r); 30(3q); 31(7r); 32(2j); 33(2l); 37(4s); 38(3q); 39(1w); 48(5B); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 57(1w); 58(1w); 61(11f); 62(6O); 63(4n).

326. *Chlamydatus pulicarius* (Fallén) (Miridae)




A total of 13 vice-county records: 13(7F); 22(5s); 23(1w); 26(5f); 28(4e); 30(1w); 58(1w); 63(5B); 69(5B); 88(5x); 92(5x); 96(5x); 106(5x).

327. *Chlamydatus pullus* (Reuter) (Miridae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 4(10y); 10(3f); 11(4x); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(4f); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 38(2h); 41(1w); 44(1w); 48(1w); 49(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 58(1w); 61(11f); 63(4n); 65(4n); 67(5r); 77(5B); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 96(5x); 106(5x); 107(5B); H9(5C).

328. *Chlamydatius saltitans* (Fallén) (Miridae)




A total of 47 vice-county records: 1(2g); 5(5l); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(2q); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(10D); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 32(1w); 35(1w); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 49(1w); 52(5B); 53(3o); 55(1w); 57(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 63(4n); 64(4n); 67(5r); 70(1w); 75(5x); 88(5x); 95(5x); 96(5B).

329. *Chlamydatus wilkinsoni* (Douglas & Scott) (Miridae)




A total of 25 vice-county records: 18(4p); 37(1w); 39(1w); 40(3q); 43(5B); 48(1w); 49(1w); 57(3p); 60(10d); 62(4n); 65(11f); 69(5B); 70(1w); 73(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x).

330. *Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer) (Miridae)




A total of 50 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5o); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6Y); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 47(1w); 48(1w); 50(6f); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 62(11f); 63(4n); 64(4n).

331. *Closterotomus norwegicus* (Gmelin) (Miridae)




A total of 130 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5A); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(3p); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(13g); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(10n); 81(5x); 82(5B); 83(5x); 84(5B); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(8g); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 98(5B); 99(5B); 100(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

332. *Closterotomus trivialis* (A. Costa) (Miridae)




A total of 24 vice-county records: 6(7G); 12(10j); 13(7F); 14(7F); 16(6o); 17(1w); 18(9h); 19(13g); 20(5D); 21(1w); 22(7s); 23(1w); 27(12i); 28(4e); 30(10d); 32(7r); 33(8d); 55(11b); 57(4n); 58(10d); 59(10d); 60(10d); 69(1w); H4(10d).

333. *Compsidolon salicellum* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 71 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(9i); 5(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(10l); 48(1w); 49(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5B); 60(10d); 61(11f); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 69(5B); H2(3e); H3(5C); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H12(5C); H13(5C); H15(3e); H16(3e); H19(5C); H20(3e); H21(3e); H27(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

334. *Conostethus brevis* Reuter (Miridae)



A total of 11 vice-county records: 25(5B); 68(5r); 82(5x); 85(5x); 93(5x); 95(5x); 96(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5B); H38(3e).

335. *Conostethus griseus* Douglas & Scott (Miridae)




A total of 23 vice-county records: 9(1w); 10(3f); 13(5h); 14(7F); 15(5B); 16(4t); 18(4p); 19(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 41(5B); 53(3o); 54(3o); 58(1w); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 66(1w); 69(1w); 70(1w); 72(5x); H38(5C).

336. *Conostethus roseus* (Fallén) (Miridae)




A total of 22 vice-county records: 1(2g); 6(5l); 12(4x); 13(6t); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 31(6δ); 32(1w); 38(3p); 40(5w); 57(5B); 62(4n); 63(4n).

337. *Conostethus venustus* (Fieber) (Miridae)




A total of 8 vice-county records: 31(7r); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 61(6c); 62(6R); 63(4n); 66(4s).

338. *Cyllecoris histrionius* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 98 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 4(10y); 5(5l); 6(5o); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 43(5B); 44(2n); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 48(5B); 49(5B); 50(6f); 51(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5B); 66(5r); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 76(7q); 81(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 106(5B); 107(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H27(3e); H33(5C); H37(5C); H38(3e); H39(3e).

339. *Cyrtorhinus caricis* (Fallén) (Miridae)




A total of 104 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(5B); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 81(5x); 82(5x); 84(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(9h); 99(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5B); 107(5x); 108(5B); 110(5x); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(5C); H12(3e); H16(5C); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

340. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa) (Miridae)




A total of 51 vice-county records: 3(5B); 6(5B); 7(5j); 8(5A); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(6Y); 32(1w); 33(2l); 34(8d); 36(6G); 37(60); 38(3p); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 50(8j); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(6O); 63(4n); 66(4s); 67(5r); 77(5B); H37(6y).

341. *Deraeocoris lutescens* (Schilling) (Miridae)




A total of 64 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(6S); 6(5I); 7(7s); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6Y); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 35(5B); 36(7s); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 43(1w); 44(2n); 45(5B); 46(5B); 50(6f); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(3p); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(5B); 62(6V); 63(4n); 64(4n); 65(10d); 69(5B); 75(5B); 79(10s); H13(10d); H21(10d); H39(10d).

342. *Deraeocoris olivaceus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 18 vice-county records: 8(5j); 11(5B); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 30(1w); 34(5B); 35(5B); 54(3o).

343. *Deraeocoris ruber* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 61 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6Y); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(6d); 50(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4w); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); H4(5C); H6(5C); H21(3e).

344. *Deraeocoris scutellaris* (Fabricius) (Miridae)




A total of 32 vice-county records: 1(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(7F); 14(7F); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 22(9s); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 32(1w); 33(8d); 39(5B); 60(5B); 62(4n); 63(4n); 65(11f); 69(1w); 70(1w); 81(5x); 96(5B); 105(5x); H19(3e).

345. *Dichrooscytus gustavi* Josifov (Miridae)




A total of 27 vice-county records: 8(5t); 9(6n); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(7F); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 21(7s); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 29(5B); 30(5q); 33(2l); 34(2l); 35(6n); 37(1w); 40(3q); 53(3o); 60(10d); 61(6O); 62(6O); 63(11f).

346. *Dichroscytus rufipennis* (Fallén) (Miridae)




A total of 58 vice-county records: 1(5B); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 29(3p); 30(5q); 33(2l); 36(1w); 38(2h); 39(1w); 41(1w); 44(5B); 45(5B); 46(5B); 48(5B); 49(5B); 52(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 70(1w); 72(5x); 78(10n); 82(5B); 84(5x); 85(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(7s); 105(5x); 106(5B); H2(3e); H21(3e); H38(5C).

347. *Dicyphus annulatus* (Wolff) (Miridae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(7s); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 38(2h); 40(3q); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(5B); 50(6f); 52(1w); 55(1w); 58(5B); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 66(1w); 67(7s); 68(5B); 81(5x); 82(5x); 85(5x); 88(5x); 90(5x).

348. *Dicyphus bolivari* Lindberg (Miridae)




A total of 8 vice-county records: 3(13j); 14(11f); 16(4t); 17(3q); 18(4p); 21(6x); 28(13g); 30(10d).

349. *Dicyphus constrictus* (Boheman) (Miridae)




A total of 47 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 6(5B); 10(3f); 11(3f); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 27(4e); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 49(1w); 50(9l); 54(3o); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 61(11f); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 66(5r); 67(5r); 70(5B); 81(5x); 82(5x); H1(3e); H23(5C).

350. *Dicyphus epilobii* Reuter (Miridae)




A total of 92 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6d); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(5B); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 81(5x); 82(5x); 83(5B); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 96(5B); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H12(3e); H13(5C); H14(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H27(3e); H31(3e); H33(5C); H36(5C); H37(5C); H39(5C).

351. *Dicyphus errans* (Wolff) (Miridae)




A total of 72 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 6(5I); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(5B); 49(1w); 50(9I); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(6O); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 69(1w); 104(5x); H3(3e); H6(5C); H12(3e); H13(5C); H17(5C); H20(5C); H21(3e); H25(5C); H38(5C).

352. *Dicyphus escalerae* Lindberg (Miridae)




A total of 17 vice-county records: 3(5o); 17(1w); 20(6H); 22(1w); 23(1w); 29(7r); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 38(3p); 49(1w); 55(1w); 57(3p); 61(11f); 63(11f); 96(9h).

353. *Dicyphus globulifer* (Fallén) (Miridae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(5B); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 51(8j); 52(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(5B); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 81(5x); 82(5B); 85(5B); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 106(5x).

354. *Dicyphus pallicornis* (Fieber) (Miridae)




A total of 85 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(10z); 13(7F); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(2i); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(5B); 49(1w); 50(6f); 51(5B); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(11f); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 76(7q); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5B); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H13(5C); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H38(5C).

355. *Dicyphus pallidus* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 16 vice-county records: 12(3f); 13(5h); 14(7F); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(13g); 28(8f); 29(7r); 30(1w); 32(7r); 33(2l); 61(11f).

356. *Dicyphus stachydis* J. Sahlberg (Miridae)




A total of 94 vice-county records: 2(2g); 3(10y); 4(10y); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 47(5B); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5B); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 77(5B); 80(10s); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 88(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 104(5B); 105(5B); 106(5x); H2(5C); H6(3e); H9(3e); H11(5C); H13(5C); H14(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(3e); H33(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

357. *Dryophilocoris flavoquadrимaculatus* (De Geer) (Miridae)




A total of 72 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(10y); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6y); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 46(1w); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(5B); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 78(10s); 84(10s); 86(5x); 95(5B); 96(5B); 106(5B); H40(3e).

358. *Europiella artemisiae* (Becker) (Miridae)




A total of 38 vice-county records: 3(10y); 9(10C); 11(3r); 12(4x); 13(8o); 14(7F); 15(10C); 16(10C); 17(4y); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(2k); 23(2k); 24(2k); 25(11b); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(1w); 31(7r); 32(2k); 33(10C); 34(10C); 38(3p); 39(3p); 40(5w); 53(3o); 54(13g); 56(3p); 58(1w); 59(10d); 61(4n); 62(11f); 63(11f); 65(11f).

359. *Europiella decolor* (Uhler) (Miridae)




A total of 11 vice-county records: 13(5h); 14(7F); 15(4z); 18(4p); 25(5f); 26(8f); 27(4e); 28(4e); 53(12i); 61(4n); 63(11f).

360. *Fieberocapsus flaveolus* (Reuter) (Miridae)




A total of 31 vice-county records: 9(1w); 12(10z); 13(7F); 14(11f); 15(4t); 17(1w); 18(4p); 20(3h); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(7r); 33(2l); 35(5B); 38(2h); 40(5w); 45(1w); 54(3o); 61(4n); 62(5r); 63(11f); 64(4n); H16(5C); H21(3e); H38(3e).

361. *Globiceps flavomaculatus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 6(5l); 9(1w); 10(6y); 11(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 22(5s); 23(1w); 25(5f); 29(1w); 33(8d); 34(11f); 36(1w); 37(9y); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 49(1w); 51(1w); 54(3o); 55(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 66(1w); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(5C); H11(3e); H15(3e); H16(3e); H17(5C); H33(5C); H37(3e); H39(3e).

362. *Globiceps fulvicollis* Jakovlev (Miridae)




A total of 29 vice-county records: 1(2g); 9(1w); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 21(4f); 23(5s); 37(6θ); 38(2h); 41(5B); 44(1w); 48(1w); 52(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 63(4n); 66(1w); 92(5x); 95(5x); 108(5x); H9(3e); H15(5C).

363. *Globiceps juniperi* Reuter (Miridae)



A total of 16 vice-county records: 12(3f); 13(5h); 17(1w); 23(7J); 40(5w); 54(3o); 58(10d); 59(10d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 68(5B); 70(5B); 92(5x); 95(5x); 106(5B).

364. *Grypocoris stysi* (Wagner) (Miridae)




A total of 115 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 11(3r); 12(2d); 13(5h); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(6N); 29(4v); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 81(5x); 82(5B); 83(5x); 85(5B); 86(5x); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 90(5B); 91(8g); 95(5B); 96(5B); 99(5x); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H4(5C); H5(5C); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

365. *Hadrodemus m-flavum* (Goeze) (Miridae)




Only one vice-county record: 15(4t).

366. *Hallodapus montandoni* Reuter (Miridae)




A total of 10 vice-county records: 6(5l); 9(1w); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 22(9s); 23(1w); 24(9k); 33(2l); 34(2l).

367. *Hallodapus rufescens* (Burmeister) (Miridae)




A total of 38 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(11f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 29(1w); 30(5q); 33(2l); 39(1w); 40(5w); 43(5B); 44(1w); 48(5B); 50(5B); 61(11f); 62(4n); 63(4n); 85(5x); 87(5x); 89(5x); 92(5x); 96(5x); 106(5B); 110(5x); H16(3e); H17(3e); H23(4s).

368. *Halticus apterus* (Linnaeus) (Miridae)



A total of 30 vice-county records: 3(10y); 9(1w); 12(5B); 13(11f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(3q); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 32(7r); 36(1w); 38(2h); 40(3q); 41(1w); 43(1w); 52(5B); 57(11b); 67(5r); 80(6Z); 85(6Z).

369. *Halticus luteicollis* (Panzer) (Miridae)




A total of 22 vice-county records: 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(7s); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(2i); 22(1w); 23(1w); 24(3q); 25(5f); 26(5f); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 41(1w).

370. *Halticus macrocephalus* Fieber (Miridae)




A total of 2 vice-county records: 1(2g); 2(2g).

371. *Halticus saltator* (Geoffroy) (Miridae)




A total of 9 vice-county records: 15(5B); 16(4t); 20(2o); 22(1w); 23(5s); 29(1w); 37(6θ); 55(1w); 58(1w).

372. *Harpocera thoracica* (Fallén) (Miridae)




A total of 98 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(5B); 44(2n); 45(6d); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(7q); 78(10s); 79(10s); 86(12h); 88(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 98(5B); 99(7q); 105(5x); 106(5B); 107(5B); H1(5C); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(5C); H6(3e); H13(5C); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H25(5C); H27(3e); H33(5C); H34(3e); H38(3e); H39(5C); H40(5C).

373. *Heterocordylus genistae* (Scopoli) (Miridae)




A total of 44 vice-county records: 1(2g); 5(5l); 6(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(10z); 13(7s); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(5s); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 29(1w); 30(5q); 32(1w); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(5B); 45(1w); 50(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 60(5d); 63(4n); 64(4n); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 85(5x); 96(5B); 107(5B).

374. *Heterocordylus parvulus* Reuter (Miridae)




A total of 2 vice-county records: 41(10v); 42(10v).

375. *Heterocordylus tibialis* (Hahn) (Miridae)




A total of 87 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 45(1w); 46(1w); 48(5B); 49(5B); 52(1w); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 76(10s); 77(10d); 79(10s); 80(10s); 81(5x); 82(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H6(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H15(3e); H20(3e); H33(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

376. *Heterotoma planicornis* (Pallas) (Miridae)




A total of 86 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5A); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5B); 68(12i); 69(5B); 70(1w); 83(5B); 86(5B); 89(5x); 90(5x); H1(3e); H2(5C); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H19(5C); H21(3e).

377. *Hoplomachus thunbergii* (Fallén) (Miridae)




A total of 39 vice-county records: 3(5o); 6(5B); 8(10r); 11(10B); 12(6q); 13(7F); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(6N); 27(5B); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 38(2h); 40(5w); 41(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 66(5B).

378. *Hypseloecus visci* (Puton) (Miridae)




A total of 18 vice-county records: 5(5l); 8(5j); 9(7C); 11(3f); 12(10z); 17(9A); 20(6h); 21(1w); 22(1w); 23(3d); 24(8h); 27(5B); 29(7r); 30(1w); 33(2l); 36(7s); 37(6θ); 40(5w).

379. *Leptopterna dolabrata* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 124 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5B); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(10n); 80(5B); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5B); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 91(8g); 92(5x); 93(5B); 94(5B); 95(5B); 96(5x); 99(5x); 102(5x); 104(5B); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5B); H1(3e); H2(5C); H3(5C); H6(3e); H8(5C); H9(5C); H12(3e); H13(5C); H14(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(5C); H21(5C); H24(5C); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H34(5C); H35(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

380. *Leptopterna ferrugata* (Fallén) (Miridae)




A total of 119 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3r); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(5B); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5B); 75(5B); 76(10s); 77(10d); 82(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5B); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 98(5B); 99(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 109(5B); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(5C); H12(5C); H13(5C); H15(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H27(3e); H28(3e); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

381. *Liocoris tripustulatus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 114 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 78(9h); 79(10s); 80(10s); 81(5x); 83(5B); 84(10s); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 93(5B); 95(10k); 96(5x); 97(9h); 104(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H27(5C); H31(5C); H32(5C); H33(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

382. *Lopus decolor* (Fallén) (Miridae)




A total of 65 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(1w); 33(2l); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 44(2n); 46(1w); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(6R); 63(4n); 64(4n); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 86(5B); 88(5x); 96(5B); 99(5B); H20(3e).

383. *Lygocoris pabulinus* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 125 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5x); 77(5x); 78(9h); 81(5x); 83(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(5x); 100(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H32(3e); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

384. *Lygocoris rugicollis* (Fallén) (Miridae)




A total of 98 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(3p); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(3q); 41(1w); 44(1w); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 77(7q); 79(10s); 83(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(5x); 100(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H3(3e); H7(3e); H12(3e); H15(5C); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H35(3e); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

385. *Lygus maritimus* Wagner (Miridae)




A total of 62 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(5B); 17(4y); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 25(5B); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 34(2l); 38(2h); 40(4s); 41(5B); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 48(5B); 49(5B); 52(1w); 54(3o); 58(10d); 59(5d); 60(10d); 61(6c); 62(11f); 63(4n); 67(7s); 68(5B); 69(5B); 70(5B); 71(5B); 72(5x); 84(5B); 85(5x); 88(5x); 90(5x); 95(5B); 96(5B); 104(5B); 106(5x); 107(5B); H9(3e); H12(5C); H16(3e); H18(3e); H38(3e); H39(3e).

386. *Lygus pratensis* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 42 vice-county records: 3(9i); 8(10r); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6d); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(6d); 22(1w); 23(5s); 24(6d); 25(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 37(1w); 38(3p); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 57(3p); 58(10d); 59(10d); 61(6c); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(5B); 92(5x); 106(5B).

387. *Lygus punctatus* (Zetterstedt) (Miridae)




A total of 11 vice-county records: 62(6c); 65(4n); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 84(5B); 86(5B); 92(5x); 96(5x); 106(5B); 107(5B).

388. *Lygus rugulipennis* Poppius (Miridae)




A total of 113 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(5h); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(5B); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 66(5B); 67(5B); 68(5B); 69(1w); 70(5B); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 80(5B); 81(5x); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 97(9h); 99(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5B); 110(5x); H1(3e); H2(5C); H4(3e); H5(5C); H6(3e); H9(3e); H12(3e); H15(5C); H19(3e); H22(5C); H23(5C); H26(5C); H31(5C); H35(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5B); H39(5C); H40(5B).

389. *Lygus wagneri* Remane (Miridae)




A total of 68 vice-county records: 6(5B); 9(1w); 13(7F); 14(7F); 20(2o); 22(5s); 23(1w); 26(6N); 27(4e); 30(1w); 33(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(3p); 39(5B); 41(5B); 42(5B); 43(1w); 44(2n); 45(5B); 48(5B); 49(5B); 50(5B); 53(3o); 54(3o); 57(3p); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 69(5B); 70(5B); 72(5B); 76(10s); 77(10d); 78(10s); 79(10s); 80(5x); 83(5B); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 96(5B); 97(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 112(9y); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H9(3e); H17(5C); H19(5C); H21(5C); H25(5C); H27(5C); H29(5C); H33(5C); H35(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

390. *Macrolophus pygmaeus* (Rambur) (Miridae)




A total of 30 vice-county records: 3(9i); 7(5j); 12(3g); 14(7F); 16(4t); 17(4y); 18(4p); 20(2o); 21(4f); 22(9i); 23(4b); 24(1w); 27(4e); 29(7r); 30(1w); 32(1w); 38(2h); 42(5B); 44(2n); 46(5B); 53(3o); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 63(5B); 70(5B); 96(5B); H20(3e); H25(3e); H37(4s).

391. *Macrolophus rubi* Woodroffe (Miridae)




A total of 34 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 7(5j); 11(3r); 12(3g); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 17(1w); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 29(7r); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(5B); 53(3o); 57(5B); 58(10d); 59(10d); 61(11f); 63(5B); 69(1w); 96(5B); H3(3e); H13(5C); H37(3e); H38(3e).

392. *Macrotylus horvathi* (Reuter) (Miridae)




A total of 17 vice-county records: 13(11f); 15(4t); 16(4t); 17(6x); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(6d); 22(9i); 23(9t); 25(11b); 26(8f); 28(10n); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(7r).

393. *Macrotylus paykullii* (Fallén) (Miridae)




A total of 60 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5I); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 35(5B); 36(1w); 38(2h); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 52(1w); 54(3o); 55(11b); 56(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 66(5B); 67(5B); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 82(5B); H6(3e); H12(3e); H20(3e); H21(3e); H38(5C).

394. *Macrotylus solitarius* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 37 vice-county records: 11(3r); 12(3f); 13(6t); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 42(5B); 45(2n); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 59(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(5r); 70(5B).

395. *Malacocoris chlorizans* (Panzer) (Miridae)




A total of 86 vice-county records: 2(2g); 3(10y); 4(5B); 5(5I); 6(5I); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6d); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 35(5B); 36(1w); 38(2h); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 81(5x); 83(5x); 88(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 104(5B); 105(5B); 106(5B); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H11(5C); H16(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H33(5C); H38(5C).

396. *Mecomma ambulans* (Fallén) (Miridae)




A total of 124 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(8j); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 77(5x); 80(5B); 81(5x); 82(5B); 83(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(5x); 100(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5B); 108(5B); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(3e).

397. *Mecomma dispar* (Boheman) (Miridae)




A total of 50 vice-county records: 1(5B); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 13(5h); 17(1w); 19(4p); 23(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 32(7r); 33(2l); 39(5B); 40(1w); 41(1w); 45(1w); 49(1w); 52(5B); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 67(5r); 68(5r); 70(1w); 72(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 104(5x); 106(5B); H5(3e); H9(5C); H12(3e); H16(5C); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H27(3e); H28(3e); H35(5C); H36(5C).

398. *Megacoelum beckeri* (Fieber) (Miridae)




A total of 18 vice-county records: 6(5B); 9(1w); 11(5B); 12(3q); 13(7F); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 28(4e); 30(1w); 33(8d); 34(2l); 36(1w); H20(5C).

399. *Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 52 vice-county records: 3(5o); 4(10y); 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(5s); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 48(1w); 49(1w); 50(6f); 53(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); H7(9y).

400. *Megaloceroea recticornis* (Geoffroy) (Miridae)




A total of 53 vice-county records: 1(2g); 4(10y); 6(5B); 8(5j); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(7s); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 45(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(3p); 58(1w); 59(5B); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 67(5B); H37(3e); H38(10d); H39(3e).

401. *Megalocoleus molliculus* (Fallén) (Miridae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 44(1w); 49(5B); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 58(1w); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 68(5r); 69(5B); 70(5B); 88(5x); 90(5x); H2(3e); H6(3e); H7(3e); H20(3e); H21(3e).

402. *Megalocoleus tanacetii* (Fallén) (Miridae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 33(7s); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(3q); 41(1w); 52(5B); 53(3o); 56(1w); 57(1w); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 66(1w); 70(5B); 86(5B); 88(5x).

403. *Miridius quadrivirgatus* (A. Costa) (Miridae)




A total of 35 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 21(4y); 22(1w); 23(4s); 25(5f); 26(5B); 27(5B); 28(4y); 30(5q); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 45(1w); 55(5B); 59(5B).

404. *Miris striatus* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 80 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5B); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 44(2n); 46(1w); 48(5B); 49(5B); 50(5B); 51(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5B); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(5r); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 75(5B); 77(5B); 81(5x); 83(5x); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 95(5x); 99(5B); H2(3e); H12(3e); H15(3e); H20(3e); H23(5C); H25(5C); H33(5C); H39(5C).

405. *Monalocoris filicis* (Linnaeus) (Miridae)



A total of 116 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5B); 5(5I); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5B); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 77(7q); 78(9h); 81(5x); 83(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 94(5B); 95(5x); 96(5x); 99(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H20(3e); H21(5C); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H37(5C); H38(3e); H39(5C); H40(5C).

406. *Monosynamma bohemanni* (Fallén) (Miridae)




A total of 3 vice-county records: 17(1w); 30(1w); 41(5B).

407. *Monosynamma maritimum* (Wagner) (Miridae)




Only one vice-county record: 15(4t).

408. *Monosynamma sabulicola* (Wagner) (Miridae)




A total of 15 vice-county records: 4(5o); 15(4t); 22(1w); 23(1w); 30(5q); 31(7r); 41(1w); 48(5B); 52(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 69(5B); 70(5B).

409. *Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg) (Miridae)




A total of 11 vice-county records: 6(5B); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 14(7F); 17(1w); 23(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 35(5B).

410. *Neolygus contaminatus* (Fallén) (Miridae)




A total of 106 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 4(10y); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 44(2n); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(5B); 75(5B); 77(7q); 81(5x); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(7q); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H27(5C); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H37(3e); H39(3e).

411. *Neolygus populi* (Leston) (Miridae)




A total of 28 vice-county records: 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(7F); 14(7F); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 29(3p); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 34(2l); 38(2h); 40(5w); 53(3o); 55(3p); 58(1w); 59(10d); 61(4n); 63(11f); 64(11f).

412. *Neolygus viridis* (Fallén) (Miridae)




A total of 90 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 6(5l); 7(7s); 8(10r); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5B); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(2n); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 51(8j); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 78(11b); 81(11b); 82(5B); 83(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 97(5x); 99(7q); 104(5x); 105(5x); 106(5B); H1(3e); H2(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H37(3e); H38(5B); H39(3e).

413. *Notostira elongata* (Geoffroy) (Miridae)




A total of 75 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5A); 4(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(5B); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 68(5B); 69(5B); 70(1w); 71(5d); 72(5B); 75(5B); 83(5x); 96(5B).

414. *Notostira erratica* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 13 vice-county records: 7(5j); 22(3q); 23(1w); 24(3q); 30(7s); 32(3q); 33(3q); 38(3q); H2(5C); H5(3e); H6(3e); H12(3e); H20(3e).

415. *Oncotylus viridiflavus* (Goeze) (Miridae)




A total of 49 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 6(5B); 7(6r); 8(5j); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(2i); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(60); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 45(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 61(5B); 63(4n); 64(11f).

416. *Orthocephalus coriaceus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 43 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(7s); 7(6T); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 35(5B); 36(3p); 37(1w); 40(5w); 41(1w); 44(2n); 46(1w); 58(1w); 62(4n); 88(5x); 95(5x); H6(3e); H23(5C); H27(3e).

417. *Orthocephalus saltator* (Hahn) (Miridae)




A total of 78 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 6(5o); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(5B); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 58(1w); 60(10d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 66(1w); 70(1w); 75(5B); 88(5x); 95(5x); 96(5x); 105(9i); 106(5B); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H15(3e); H16(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H31(3e); H38(3e).

418. *Orthonotus rufifrons* (Fallén) (Miridae)




A total of 56 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 46(5B); 50(6f); 51(8j); 53(3o); 54(3o); 55(10n); 56(1w); 57(1w); 58(10d); 59(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 72(5x); H21(3e).

419. *Orthops basalis* (A. Costa) (Miridae)




A total of 51 vice-county records: 9(1w); 11(3r); 12(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 17(7s); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(7s); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 40(1w); 45(2n); 46(2n); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 57(5B); 58(10d); 60(10d); 61(4n); 62(5B); 63(11f); 64(4n); 66(5r); 70(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5B); 106(5x); 107(5B); 109(5x); H23(3e).

420. *Orthops campestris* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 92 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 7(6T); 8(5j); 9(3r); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5A); 14(5B); 15(4t); 16(4z); 17(4f); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(5s); 24(1w); 25(5B); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(3p); 30(5q); 31(7r); 32(3p); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(3p); 41(5B); 44(1w); 45(2n); 46(5B); 49(5B); 50(6f); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(3p); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4w); 63(4n); 64(7s); 66(5r); 68(5B); 69(5B); 70(5B); 71(5B); 77(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 97(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H4(5C); H5(5C); H6(5C); H9(3e); H12(5C); H28(5C); H31(5C); H32(5C); H33(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

421. *Orthops kalmii* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 44 vice-county records: 1(6d); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 14(7F); 15(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 33(7s); 35(5B); 37(60); 38(2h); 40(5w); 41(5B); 44(5B); 45(2n); 46(5B); 47(5B); 49(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 61(6c); 70(5B); 78(10s); 96(5B); 106(5x).

422. *Orthotylus adenocarpi* (Perris) (Miridae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 6(5l); 11(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 34(2l); 37(1w); 38(2h); 40(4s); 46(1w); 49(1w); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 60(10d); 61(11f); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 70(5B); 72(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(12m); 96(5B); 106(5x); H29(3e).

423. *Orthotylus bilineatus* (Fallén) (Miridae)




A total of 52 vice-county records: 4(5o); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 29(7r); 30(5q); 31(6δ); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 69(5B); 70(1w); 73(5x); 78(11b); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5B); H1(3e); H3(7s); H33(5C); H37(5C); H38(3e); H39(5C).

424. *Orthotylus caprai* Wagner (Miridae)




A total of 7 vice-county records: 8(5t); 17(7s); 18(4p); 22(3q); 23(1w); 24(3q); 33(8d).

425. *Orthotylus concolor* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 29 vice-county records: 6(5l); 7(5j); 10(3f); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5B); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 24(4f); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 33(2l); 37(1w); 40(5w); 41(1w); 60(10d); 62(11f); 63(11f); 66(1w); 70(1w); H6(3e).

426. *Orthotylus ericetorum* (Fallén) (Miridae)




A total of 97 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(5B); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 31(6d); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 43(5B); 45(2n); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 83(11b); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 91(8g); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 100(12i); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H6(3e); H9(3e); H15(5C); H16(3e); H19(3e); H20(3e); H23(3e); H25(5C); H33(5C); H37(5C); H38(5B); H39(5B); H40(5C).

427. *Orthotylus flavinervis* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 45 vice-county records: 1(2g); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6q); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 36(1w); 38(2h); 40(5w); 42(5B); 44(2n); 46(5B); 53(3o); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 63(5B); 70(5B); 88(5x); 96(5x); H2(5C); H3(3e); H5(5C); H6(3e); H17(5C); H38(5C).

428. *Orthotylus flavosparsus* (C.R. Sahlberg) (Miridae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(6θ); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(10n); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(7s); 70(1w); H1(3e); H2(3e); H6(3e); H7(3e); H9(5C); H12(3e); H16(5C); H20(3e); H21(3e); H38(3e).

429. *Orthotylus fuscescens* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 6 vice-county records: 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 105(5B); 106(5x).

430. *Orthotylus junipericola* Linnavuori (Miridae)




A total of 7 vice-county records: 12(3q); 16(7s); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(9i); 30(5q).

431. *Orthotylus marginalis* Reuter (Miridae)




A total of 110 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 6(5B); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6ð); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 75(5B); 82(5B); 83(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H15(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(5C); H39(3e).

432. *Orthotylus moncreaffi* (Douglas & Scott) (Miridae)




A total of 22 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 34(2l); 41(5B); 44(2n); 45(2n); 53(3o); 54(3o); 60(10d); 61(4n); 68(5B).

433. *Orthotylus nassatus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 47 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(8o); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(7r); 35(5B); 36(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 49(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 58(1w); 61(6c); 62(4n); 63(11f); 64(11f); 65(4n); 66(1w); 70(5B); 81(5x); 95(5x); H1(3e).

434. *Orthotylus ochrotrichus* Fieber (Miridae)




A total of 70 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 5(5l); 6(5B); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 34(2l); 35(5B); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 43(5B); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 70(5B); 105(5B); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H12(3e); H20(3e); H21(3e); H33(5C); H38(3e); H39(5C).

435. *Orthotylus prasinus* (Fallén) (Miridae)




A total of 37 vice-county records: 3(10y); 8(5j); 9(1w); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 28(11b); 29(4v); 30(1w); 31(7r); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 38(2h); 40(1w); 44(2n); 46(1w); 49(6y); 53(3o); 54(3o); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 82(5B); H1(3e); H9(3e); H25(3e).

436. *Orthotylus rubidus* (Puton) (Miridae)




A total of 13 vice-county records: 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 22(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 61(4n).

437. *Orthotylus tenellus* (Fallén) (Miridae)




A total of 61 vice-county records: 2(2g); 3(10y); 4(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(8f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 35(5B); 36(1w); 38(2h); 40(3p); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 50(9l); 53(3o); 54(3o); 55(10n); 56(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 106(5x); H1(3e); H8(3e); H17(3e); H21(3e); H25(5C); H37(5C).

438. *Orthotylus virens* (Fallén) (Miridae)




A total of 8 vice-county records: 13(7F); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 79(5x).

439. *Orthotylus virescens* (Douglas & Scott) (Miridae)




A total of 79 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 66(1w); 70(1w); 72(5x); 85(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); H1(3e); H2(5C); H3(5C); H5(3e); H6(3e); H12(3e); H20(3e); H34(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C); H40(3e).

440. *Orthotylus viridinervis* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 43 vice-county records: 2(2g); 3(9i); 4(10y); 7(7s); 9(1w); 11(6y); 13(7F); 14(7F); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(5B); 48(1w); 49(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(5B); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 69(5B); 70(1w); 75(5B); 81(5x); 83(5B); H2(3e); H6(3e); H17(3e).

441. *Pachytomella parallela* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 49 vice-county records: 2(7s); 3(5o); 4(10y); 9(1w); 14(7F); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 22(1w); 24(1w); 26(6N); 28(4e); 33(2l); 35(4y); 36(7s); 37(1w); 41(5B); 42(5B); 44(5B); 63(11f); 65(4n); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(5B); 72(5x); 75(5B); 77(5x); 78(10s); 80(5x); 81(11b); 82(5B); 83(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 97(9h); 98(5B); 101(5B); 105(5B); 106(5x); 107(5B); 108(5x); 110(10n); H21(3e); H26(3e).

442. *Pantilius tunicatus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 86 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(2n); 45(1w); 46(5B); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 50(6f); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 89(9i); 93(10c); 95(5x); 96(5B); 97(11d); 106(5B); 107(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H4(5C); H6(3e); H8(5C); H9(3e); H11(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H28(3e); H31(5C); H37(5C); H38(3e); H39(5C).

443. *Parapsallus vitellinus* (Scholtz) (Miridae)




A total of 20 vice-county records: 9(1w); 14(7F); 15(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 30(5q); 32(7r); 33(2l); 37(1w); 38(2h); 41(1w); 47(5B); 63(11f); 82(5B); 89(5x); 96(5B).

444. *Phoenicocoris obscurellus* (Fallén) (Miridae)




A total of 52 vice-county records: 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 32(1w); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 40(5w); 41(1w); 50(9i); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(11f); 63(11f); 64(11f); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 82(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 105(5B); 106(5x).

445. *Phylus coryli* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 78 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(6G); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(7s); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 81(5x); 83(10n); 88(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5x); 104(5B); 106(5x); H2(3e); H3(3e); H13(5C); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H28(3e); H29(5C).

446. *Phylus melanocephalus* (Linnaeus) (Miridae)



A total of 94 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5o); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(7s); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 44(2n); 45(2n); 46(2n); 47(5B); 48(5B); 49(5B); 50(6f); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 77(5B); 81(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 97(5x); 99(7q); 104(7s); 105(5B); 106(5x); H1(3e); H3(3e); H8(3e); H13(5C); H17(3e); H20(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H34(3e); H37(5C); H38(5C); H40(5C).

447. *Phytocoris dimidiatus* Kirschbaum (Miridae)




A total of 60 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 8(5j); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(10n); 29(4v); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 48(1w); 49(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5B); 70(1w); 83(5x); 84(5x); 96(5x); 104(5B); 105(5B); 106(5B); 108(5B); H1(3e); H2(3e); H39(5C).

448. *Phytocoris insignis* Reuter (Miridae)




A total of 7 vice-county records: 12(4x); 13(7F); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 24(4f); 25(5B).

449. *Phytocoris longipennis* Flor (Miridae)




A total of 96 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(9i); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(9i); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 75(7q); 81(5x); 83(5x); 85(5B); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 104(5x); 105(5B); 106(5B); H2(3e); H3(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H9(5C); H13(5C); H15(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H27(5C); H31(5C); H33(5C); H37(3e); H38(5B).

450. *Phytocoris pini* Kirschbaum (Miridae)




A total of 32 vice-county records: 17(1w); 33(8d); 34(2l); 36(1w); 38(2h); 39(1w); 50(1w); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 70(1w); 72(5x); 76(7q); 78(10n); 82(5B); 84(5x); 85(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 105(5x); 106(5x).

451. *Phytocoris populi* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 11(3f); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 41(1w); 46(2n); 47(5B); 49(1w); 50(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(9i); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 75(7q); 77(7q); 80(5B); 83(5x); 92(5x); 99(7q); 105(5B); H2(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H33(5C); H34(3e); H37(5C); H39(3e).

452. *Phytocoris reuteri* Saunders (Miridae)




A total of 47 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(5B); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(6t); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 33(7s); 34(5B); 38(2h); 40(5w); 41(1w); 43(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(11f); 62(11f); 63(5B); 67(5r); 72(5x); 99(7q); H25(5C); H37(3e); H38(5C).

453. *Phytocoris tiliae* (Fabricius) (Miridae)




A total of 96 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 77(7q); 78(11b); 81(5x); 83(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 104(5B); 106(5B); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H8(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H31(3e); H37(3e); H38(5C); H39(5C).

454. *Phytocoris ulmi* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 79 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5A); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 46(5B); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(9l); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(7q); 82(5x); 85(5x); 99(7q); H2(3e); H6(3e); H7(3e); H8(5C); H9(3e); H19(3e); H21(3e); H37(3e).

455. *Phytocoris varipes* Boheman (Miridae)




A total of 82 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(6T); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 70(1w); 73(5x); 104(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H16(5C); H17(5C); H20(3e); H21(3e); H38(5B); H39(5C).

456. *Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum) (Miridae)



A total of 37 vice-county records: 5(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6q); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(4j); 26(5f); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(2j); 33(8d); 34(2l); 38(2h); 41(1w); 53(3o); 55(7s); 56(5B); 58(10d); 60(5d); 63(11f); 83(5x); 92(5B); H7(10d).

457. *Pilophorus clavatus* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 35 vice-county records: 9(5B); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 28(9h); 29(7r); 30(5q); 31(6δ); 32(3p); 33(2l); 34(2l); 37(6θ); 38(2h); 41(1w); 44(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 63(11f); 87(5x); 88(5x); 97(9h); H9(10d).

458. *Pilophorus confusus* (Kirschbaum) (Miridae)




Only one vice-county record: 17(1w).

459. *Pilophorus perplexus* Douglas & Scott (Miridae)




A total of 39 vice-county records: 6(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(8f); 28(4e); 29(3p); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 33(5B); 34(2l); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(5w); 41(1w); 53(3o); 55(5B); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 63(4n).

460. *Pinalitus atomarius* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 7 vice-county records: 9(1w); 11(6y); 26(5f); 27(5f); 46(5B); H20(3e); H21(3e).

461. *Pinalitus cervinus* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 113 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(7s); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 75(5B); 77(10d); 78(10s); 79(10s); 81(5x); 83(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 91(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 99(7q); 100(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H34(3e); H37(3e); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

462. *Pinalitus rubricatus* (Fallén) (Miridae)




A total of 55 vice-county records: 2(2g); 9(1w); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(1w); 32(1w); 33(2m); 36(1w); 38(3p); 39(1w); 40(3q); 41(1w); 48(1w); 49(1w); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 69(4y); 70(1w); 72(5x); 73(13g); 81(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 96(5x); 99(7q); 104(5x); 106(5x); H6(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H38(5C).

463. *Pinalitus viscicola* (Puton) (Miridae)




A total of 28 vice-county records: 3(5o); 5(5B); 8(8h); 9(1w); 11(8h); 12(6J); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(4f); 19(4p); 21(6J); 23(3d); 24(1w); 26(8h); 28(4e); 30(1w); 33(5B); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 40(4y); 56(1w); 67(5r); 70(5B).

464. *Pithanus maerkelii* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 131 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5B); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6d); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(7o); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(11b); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(7q); 77(7q); 80(6Z); 81(5x); 82(5x); 83(10n); 85(5x); 86(5x); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H10(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H24(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

465. *Placochilus seladonicus* (Fallén) (Miridae)




A total of 8 vice-county records: 14(5h); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(4k); 29(4v); 30(1w); 54(3o).

466. *Plagiognathus arbustorum* (Fabricius) (Miridae)




A total of 132 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5A); 4(5B); 5(5I); 6(5I); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2I); 34(2I); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(9h); 81(5x); 82(5B); 83(5x); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(5x); 100(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H14(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

467. *Plagiognathus chrysanthemi* (Wolff) (Miridae)




A total of 128 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(9i); 4(10y); 5(5l); 6(5l); 7(6r); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5B); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(13g); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(10n); 81(5x); 82(5B); 83(9h); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(9h); 99(5x); 100(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H27(5C); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

468. *Platycranus bicolor* (Douglas & Scott) (Miridae)




A total of 51 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(6S); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 30(5q); 31(1w); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 44(1w); 45(5B); 46(2n); 49(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 57(5B); 58(10d); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 64(11f); 68(5r); H38(3e).

469. *Plesiodema pinetella* (Zetterstedt) (Miridae)




A total of 31 vice-county records: 13(5h); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(4e); 30(5q); 32(1w); 33(2l); 48(1w); 54(3o); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 67(5r); 70(1w); 82(5B); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 105(5B); 106(5x); H38(3e).

470. *Polymerus nigrita* (Fallén) (Miridae)




A total of 64 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(7s); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(5h); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 35(5B); 38(1w); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 44(2n); 45(2n); 46(5B); 50(5B); 51(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(11f); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 82(5B); 83(5B); 89(5x); 96(5x); 97(5B); 106(5B); H19(3e).

471. *Polymerus palustris* (Reuter) (Miridae)




A total of 69 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 6(5B); 10(3f); 11(3r); 12(4x); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 34(2l); 35(5B); 37(6θ); 38(3p); 40(5w); 41(5B); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 52(5B); 56(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 64(4n); 69(1w); 70(5B); 73(5B); H1(5C); H2(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H10(3e); H12(3e); H15(5C); H17(5C); H20(3e); H21(3e); H26(5C); H27(3e); H29(3e); H32(5C); H33(5C); H34(5C); H36(5C); H37(5C); H38(3e); H39(5C).

472. *Polymerus unifasciatus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 51 vice-county records: 1(2g); 6(11f); 8(5B); 9(1w); 11(3f); 12(4x); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(10d); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(1w); 32(1w); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 41(1w); 43(5B); 44(1w); 52(5B); 54(3o); 57(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 67(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5B); 96(5x); 106(5x).

473. *Polymerus vulneratus* (Panzer) (Miridae)




A total of 2 vice-county records: 25(5f); 27(4e).

474. *Psallodema fieberi* (Fieber) (Miridae)




A total of 22 vice-county records: 6(5o); 9(1w); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 27(4e); 30(1w); 33(2l); 37(60); 38(2h); 44(1w); 54(3o); 60(10d); 61(11f); 63(4n); 70(1w); H1(3e).

475. *Psallus albicinctus* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 15 vice-county records: 7(5j); 11(3r); 12(3g); 16(4t); 17(1w); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 30(5q); 33(2l); 40(1w); 58(10d).

476. *Psallus ambiguus* (Fallén) (Miridae)




A total of 96 vice-county records: 1(2g); 2(7s); 3(7s); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6q); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(2j); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(5B); 45(2n); 46(1w); 48(5B); 49(1w); 50(7s); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 85(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 105(5x); 106(5x); 108(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H35(3e); H37(5C); H39(3e).

477. *Psallus anaemicus* Seidenstücker (Miridae)




A total of 10 vice-county records: 12(4s); 16(4t); 17(4s); 18(4s); 21(6l); 22(4m); 23(3l); 29(7r); 30(5q); 32(3q).

478. *Psallus assimilis* Stichel (Miridae)




A total of 29 vice-county records: 3(7s); 4(10y); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 14(7F); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 20(2o); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(11b); 29(4v); 30(5q); 31(6δ); 32(2j); 34(5B); 35(5B); 38(2h); 40(3q); 58(10d); 61(11f); 63(5B); 64(11f); H39(5C).

479. *Psallus betuleti* (Fallén) (Miridae)




A total of 18 vice-county records: 11(3r); 13(7F); 14(7F); 18(4p); 20(3z); 22(9i); 26(9h); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 40(5w); 41(5B); 55(5B); 95(5B); 96(5B); 104(5B); 105(5B); 108(5B).

480. *Psallus confusus* Rieger (Miridae)




A total of 40 vice-county records: 9(5B); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 27(4e); 29(7r); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 38(2h); 39(7s); 41(5B); 42(5B); 44(2n); 45(2n); 46(2n); 49(5B); 53(3o); 54(3o); 58(1w); 61(11f); 62(11f); 63(11f); 64(11f); 66(5r); 70(5B); 88(5x); 89(5x); 96(5B); 106(5x); H16(3e); H37(5C).

481. *Psallus falleni* Reuter (Miridae)




A total of 79 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(7r); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 97(9h); 100(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); H1(3e); H2(3e); H6(3e); H7(3e); H12(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H27(3e); H37(3e); H38(5C).

482. *Psallus flavellus* Stichel (Miridae)




A total of 50 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5B); 11(3r); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(4f); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(4f); 25(5f); 27(4e); 28(13g); 29(4v); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 35(5B); 36(1w); 37(6θ); 38(2h); 40(5w); 42(1w); 44(2n); 46(5B); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 60(8i); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(5B); 65(11f); 66(5r); 68(5r); 69(5B); 70(5B); 89(5x); 95(5x); 96(5B); 106(5x); H25(5C); H37(3e).

483. *Psallus haematodes* (Gmelin) (Miridae)




A total of 103 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 35(1w); 36(1w); 37(7s); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 78(9h); 81(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(8g); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 98(7q); 99(7q); 100(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H27(3e); H31(3e); H33(5C); H34(3e); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(3e); H40(3e).

484. *Psallus helenae* Josifov (Miridae)




A total of 9 vice-county records: 12(3g); 14(7F); 15(13g); 16(4t); 21(6l); 23(3l); 29(7r); 30(5q); 32(3q).

485. *Psallus lepidus* Fieber (Miridae)




A total of 79 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 4(10y); 6(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(10n); 29(3p); 30(1w); 31(6δ); 32(2j); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 44(2n); 45(2n); 46(5B); 49(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4w); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(11f); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 81(5x); 83(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H9(5C); H16(5C); H17(3e); H21(3e); H25(5C); H27(3e); H34(5C); H35(3e); H37(5C); H39(5C).

486. *Psallus lucanicus* Wagner (Miridae)




A total of 4 vice-county records: 16(4t); 21(10d); 23(3l); 30(3l).

487. *Psallus luridus* Reuter (Miridae)




A total of 22 vice-county records: 7(5j); 8(5j); 11(3r); 13(7F); 14(7F); 15(5B); 17(1w); 20(1w); 22(1w); 23(5s); 26(5f); 30(5q); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 38(3p); 39(1w); 61(4n); 63(4n); 64(4n); 88(5x); 96(5B).

488. *Psallus mollis* (Mulsant & Rey) (Miridae)




A total of 30 vice-county records: 3(10y); 11(3r); 12(3g); 13(7F); 15(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(1w); 27(4e); 28(11b); 29(7r); 30(1w); 39(7s); 40(5w); 44(5B); 45(2n); 49(5B); 50(7s); 56(5B); 58(1w); 61(9i); 63(4n); 64(11f); 69(5d); 92(5x); 96(5B); 105(5B); 106(5x).

489. *Psallus montanus* Josifov (Miridae)




A total of 23 vice-county records: 11(3r); 12(6q); 13(6t); 17(1w); 20(1w); 21(6d); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(6N); 28(6N); 30(1w); 40(1w); 50(6f); 58(10d); 59(10d); 63(4n); 76(10s); H21(10d); H26(10d); H27(10d); H37(10d); H39(10d).

490. *Psallus pardalis* Seidenstücker (Miridae)




A total of 6 vice-county records: 9(7C); 12(6l); 21(6l); 22(4m); 23(7v); 29(7r).

491. *Psallus perrisi* (Mulsant & Rey) (Miridae)




A total of 60 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 4(10y); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(6x); 35(5B); 37(1w); 38(2h); 39(7s); 40(5w); 41(5B); 44(2n); 45(2n); 46(2n); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 53(3o); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 69(5B); 78(10s); 88(5x); 92(5x); 96(5x); 106(5B); H20(3e); H33(5C); H37(5C); H39(5C).

492. *Psallus pseudoplatani* Reichling (Miridae)




A total of 3 vice-county records: 21(1w); 31(1w); 40(3q).

493. *Psallus quercus* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 14 vice-county records: 3(10y); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 20(2o); 22(1w); 31(6δ); 32(1w); 38(2h); 58(1w); 63(5B); 70(5B); H25(5C); H37(5C).

494. *Psallus salicis* (Kirschbaum) (Miridae)




A total of 62 vice-county records: 3(10y); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(6y); 11(3f); 12(6q); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(3q); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(7r); 33(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 46(1w); 48(1w); 49(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 60(10d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 64(11f); 65(4n); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 81(5x); 95(5x); 96(5B); 104(5B); 106(5B); 107(5B); H1(3e); H2(3e); H16(5C); H21(3e).

495. *Psallus variabilis* (Fallén) (Miridae)




A total of 27 vice-county records: 10(3f); 12(3g); 13(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(5q); 31(6δ); 38(2h); 40(5w); 42(1w); 44(2n); 54(3o); 58(1w); 66(5r); 88(5x); 89(5x); 105(5B); H25(5C).

496. *Psallus varians* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 101 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(7s); 4(10y); 6(5o); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(7s); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(5B); 36(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 49(1w); 50(6f); 51(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 78(10s); 79(10s); 81(5x); 86(7q); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 104(5B); 105(5B); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H34(3e); H37(3e); H38(5C); H39(5C).

497. *Psallus wagneri* Ossiannilsson (Miridae)




A total of 36 vice-county records: 2(2g); 3(10y); 4(10y); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(10n); 29(4v); 30(5q); 31(7r); 34(2l); 38(2h); 40(5w); 58(1w); 61(11f); 62(11f); 63(4n); 64(11f); 65(5B); 66(5r); 92(5x); H25(5C); H39(3e).

498. *Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 38 vice-county records: 3(5o); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(5h); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 34(5B); 35(5B); 37(5B); 38(2h); 39(3p); 40(1w); 41(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 60(5d); 61(6c); 62(11f); 63(4n); 66(1w).

499. *Reuteria marqueti* Puton (Miridae)




A total of 11 vice-county records: 13(8o); 14(7F); 17(7s); 19(4p); 21(8o); 22(9s); 23(6β); 30(1w); 32(6β); 33(8d); 59(10d).

500. *Rhabdomiris striatellus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 98 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(3p); 41(1w); 42(1w); 43(5B); 44(2n); 45(5B); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(7s); 51(7o); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(11f); 65(5B); 66(1w); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 75(5B); 77(5B); 78(10s); 81(5x); 82(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 97(5x); 99(7q); 105(5x); 106(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H13(5C); H17(3e); H19(5C); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H27(3e); H33(5C); H34(3e); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(3e).

501. *Salicarus roseri* (Herrich-Schaeffer) (Miridae)




A total of 40 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 6(5l); 7(5j); 10(3f); 11(3r); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(8f); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(5s); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 40(5w); 49(5B); 53(3o); 55(5B); 57(3p); 58(10d); 59(10d); 61(11f); 63(4n); 64(4n).

502. *Stenodema calcarata* (Fallén) (Miridae)




A total of 135 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5B); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(10s); 79(10s); 80(10s); 81(5x); 83(5B); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(9h); 99(5B); 100(5x); 102(5x); 103(5B); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H15(3e); H16(3e); H17(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H34(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(5C); H40(5B).

503. *Stenodema holsata* (Fabricius) (Miridae)




A total of 122 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 29(1w); 32(2i); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(6y); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(9h); 80(5B); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(10n); 111(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H15(3e); H16(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(3e); H40(5C).

504. *Stenodema laevigata* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 123 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5A); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5A); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5B); 67(5B); 68(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 75(5B); 76(5B); 77(5B); 78(10s); 80(10s); 81(5x); 84(5B); 85(5B); 86(5B); 88(5x); 95(5x); 96(5B); 99(5B); 100(12i); 105(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H6(3e); H7(3e); H9(3e); H10(3e); H11(5C); H12(3e); H13(5C); H14(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H33(3e); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(5C); H40(5C).

505. *Stenodema trispinosa* Reuter (Miridae)




A total of 17 vice-county records: 3(10y); 9(4y); 11(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 54(3o); 61(4n); 63(4n).

506. *Stenotus binotatus* (Fabricius) (Miridae)




A total of 102 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(6c); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 69(5B); 70(5B); 73(13g); 74(5x); 75(5B); 77(5B); 85(5B); 86(5B); 96(5x); 98(5x); 106(5B); 110(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(5C); H16(5C); H17(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C).

507. *Sthenarus rotermundi* (Scholtz) (Miridae)




A total of 49 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 6(5l); 8(10r); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 28(9h); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(5B); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 59(5d); 60(10d); 61(6O); 62(11f); 63(5B); 64(4n); H37(10d).

508. *Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 36 vice-county records: 8(5A); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 28(4e); 30(1w); 31(6δ); 32(5B); 33(2l); 34(2l); 39(1w); 49(1w); 57(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(5r); 69(5B); 70(1w); 75(5x); 81(5x); 88(5x); 96(5B); 107(5x).

509. *Strongylocoris luridus* (Fallén) (Miridae)




A total of 9 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 9(1w); 11(3f); 15(4t); 17(1w); 45(2n); 49(5B); 70(1w).

510. *Systellonotus triguttatus* (Linnaeus) (Miridae)




A total of 20 vice-county records: 6(6y); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 21(1w); 22(1w); 24(1w); 26(5f); 28(4e); 29(1w); 38(2h); 44(1w); 59(5d); 85(5x).

511. *Teratocoris antennatus* (Boheman) (Miridae)




A total of 37 vice-county records: 3(5o); 6(5B); 7(11e); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(9h); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 41(5B); 44(2n); 49(5B); 58(1w); 61(11f); 63(4n); 67(5B); 82(5x); 97(5x).

512. *Teratocoris caricis* Kirkaldy (Miridae)




A total of 10 vice-county records: 13(7F); 49(2x); 67(5r); 69(1w); 70(5B); 85(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x).

513. *Teratocoris saundersi* Douglas & Scott (Miridae)




A total of 93 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 4(10y); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 18(4p); 19(5B); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 38(2h); 40(4s); 41(5B); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 45(2n); 46(2n); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 52(1w); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 80(5x); 83(5x); 85(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(9h); 99(5x); 100(5x); 104(5x); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 109(5x); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H5(3e); H6(3e); H7(3e); H10(3e); H11(3e); H12(3e); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H35(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(3e); H40(5C).

514. *Teratocoris viridis* Douglas & Scott (Miridae)




A total of 24 vice-county records: 39(1w); 50(5B); 57(1w); 58(1w); 62(11f); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5r); 69(1w); 70(5B); 72(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 106(5x); 110(5x); 111(5x); H15(3e); H28(3e); H29(3e); H34(3e); H35(5C).

515. *Tinicephalus hortulanus* (Meyer-Dür) (Miridae)




A total of 37 vice-county records: 6(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 28(11b); 30(5q); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 39(1w); 41(1w); 49(5B); 57(1w); 60(6y); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 76(7q); 84(5x); 92(5x).

516. *Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy) (Miridae)




A total of 43 vice-county records: 1(2g); 11(3r); 13(5h); 14(7F); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(5D); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(2v); 25(7s); 26(5f); 27(7s); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 33(7s); 34(2l); 35(5B); 38(2h); 39(3p); 50(9l); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(10d); 59(10d); 60(10d); 61(4n); 62(11f); 63(4n); 68(5B); 86(5B); 95(5B).

517. *Trigonotylus psammaecolor* Reuter (Miridae)




A total of 23 vice-county records: 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 48(5B); 52(5B); 54(3o); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 69(5B); 70(1w); 85(5x); 95(5x); 96(5x).

518. *Trigonotylus ruficornis* (Geoffroy) (Miridae)




A total of 72 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(10y); 4(10y); 5(6S); 9(7s); 11(2v); 13(5h); 14(5B); 15(5B); 16(4t); 17(2v); 18(4p); 19(4p); 20(2o); 22(2v); 23(2v); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 31(7r); 32(7r); 35(5B); 37(6θ); 38(3p); 39(3p); 40(5w); 41(5B); 42(5B); 44(5B); 45(2n); 52(5B); 54(3o); 56(5B); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4w); 62(6O); 63(5B); 66(5B); 67(5r); 68(5B); 69(5B); 70(5B); 72(5B); 75(5B); 86(5B); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 104(5B); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H6(5C); H9(5C); H12(3e); H13(5C); H16(5C); H27(5C); H33(5C); H35(5C); H37(5C); H38(5C).

519. *Tropidosteptes pacificus* (Van Duzee) (Miridae)




A total of 2 vice-county records: 21(1w); 59(10d).

520. *Tupiocoris rhododendri* (Dolling) (Miridae)




A total of 28 vice-county records: 1(2g); 9(6A); 11(6A); 12(4x); 13(7F); 14(7F); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(10n); 30(1w); 34(8d); 38(3p); 40(1w); 44(5B); 53(3o); 57(1w); 60(10d); 61(11f); 62(6O); 63(4n); H5(11f); H14(11f).

521. *Tuponia brevirostris* Reuter (Miridae)




A total of 3 vice-county records: 11(6p); 13(6p); 21(6p).

522. *Tuponia hippophaes* (Fieber) (Miridae)




A total of 9 vice-county records: 10(6p); 11(6p); 22(6p); 23(6p); 24(6p); 25(6p); 28(10n); 29(7r); 31(7r).

523. *Tuponia mixticolor* (A. Costa) (Miridae)




A total of 12 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 19(4p); 21(1w); 23(4d); 25(5f); 28(4e).

524. *Tytthus pubescens* (Knight) (Miridae)




A total of 20 vice-county records: 1(2g); 16(4t); 20(1w); 21(1w); 27(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 35(5B); 39(1w); 41(5B); 45(2n); 46(2n); 52(5B); 53(3o); 58(1w); H9(3e); H16(3e); H33(5C); H38(3e).

525. *Tytthus pygmaeus* (Zetterstedt) (Miridae)




A total of 59 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 5(7s); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(6δ); 32(5B); 33(7s); 35(5B); 38(2h); 39(1w); 40(5w); 41(5B); 44(2n); 45(1w); 46(2n); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4w); 62(4n); 63(5B); 69(4y); 106(5x); H3(5C); H4(3e); H5(5C); H6(3e); H12(3e); H16(5C); H21(3e); H22(5C); H27(5C); H36(5C); H39(5C).

526. *Zygimus nigriceps* (Fallén) (Miridae)




A total of 3 vice-county records: 92(5x); 95(5x); 96(5x).

527. *Ceratocombus coleoptratus* (Zetterstedt) (Ceratocombidae)




A total of 41 vice-county records: 3(8h); 5(7s); 11(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 24(4f); 25(5f); 26(5A); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 31(7r); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 40(5w); 41(1w); 44(1w); 45(2n); 49(5B); 50(5B); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(8n); 64(4n); 69(1w); 85(5x); 88(5x); 95(5x); 96(5B); H2(3e).

528. *Cryptostemma alienum* Herrich-Schaeffer (Dipsocoridae)




A total of 48 vice-county records: 3(5o); 4(5o); 11(3f); 36(5B); 37(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 46(2n); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 58(1w); 60(5d); 62(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5B); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 78(13g); 83(5x); 88(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 102(5x); 104(5x); 105(5B); 106(7s); H1(3e); H2(3e); H3(7s); H4(3e); H20(3e); H21(3e); H33(5C); H35(5C); H39(3e).

529. *Pachycoleus waltli* Fieber (Dipsocoridae)




A total of 19 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 11(3f); 17(1w); 22(1w); 27(4e); 29(4v); 32(1w); 33(2l); 37(1w); 45(2n); 46(2n); 52(4s); 69(5B); 80(5x); H1(3e); H2(3e); H33(7s); H37(3e).

530. *Chartoscirta cincta* (Herrich-Schaeffer) (Saldidae)




A total of 120 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5B); 6(5l); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 52(4s); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 77(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5B); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5B); 108(5x); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H3(5C); H5(3e); H6(5C); H8(5C); H9(3e); H10(5C); H12(3e); H13(3e); H15(5C); H16(3e); H17(5C); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(5C); H24(5C); H25(3e); H26(5C); H27(3e); H28(5C); H29(3e); H30(5C); H31(3e); H32(5C); H33(5C); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(3e); H40(5B).

531. *Chartoscirta cocksii* (Curtis) (Saldidae)




A total of 55 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5B); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 28(4e); 30(5q); 33(2l); 35(5B); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 45(2n); 46(1w); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 52(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 58(1w); 60(10d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 67(5B); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 87(5x); 96(5x); 97(9h).

532. *Chartoscirta elegantula* (Fallén) (Saldidae)




A total of 34 vice-county records: 9(1w); 11(5B); 16(4t); 17(4f); 19(4p); 21(1w); 26(5B); 28(4e); 29(1w); 30(5q); 33(2l); 41(1w); 42(5B); 48(5B); 49(5B); 58(1w); 60(5d); 63(4n); 66(1w); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 76(5x); 87(5x); 96(5x); 105(5x); H2(3e); H12(3e); H16(5C); H25(5C); H27(5C); H33(5C); H40(5C).

533. *Chiloxanthus pilosus* (Fallén) (Saldidae)




A total of 16 vice-county records: 3(10y); 4(10y); 15(4t); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 34(2l); 54(3o); 58(1w); 60(5d); 66(1w); 68(13g); 69(1w); 70(1w); 72(5x); H21(3e).

534. *Halosalda lateralis* (Fallén) (Saldidae)




A total of 34 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 5(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(7s); 18(4p); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 34(2l); 41(1w); 45(2n); 48(1w); 49(5B); 52(1w); 54(3o); 58(1w); 60(5d); 69(5B); 70(1w); 82(5x); 95(5x); 96(5B); 107(5x); 110(5x); H6(3e); H12(3e); H20(3e); H21(3e).

535. *Macrosaldula scotica* (Curtis) (Saldidae)




A total of 71 vice-county records: 3(5o); 4(5o); 9(1w); 24(1w); 35(5B); 36(5B); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(5B); 44(1w); 46(1w); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 60(5d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5B); 76(5B); 77(7q); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(9h); 99(5x); 100(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5B); 108(5x); 109(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H16(5C); H17(5C); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H33(5C); H34(5C); H35(5C); H38(3e); H39(5C).

536. *Micracanthia marginalis* (Fallén) (Saldidae)




A total of 7 vice-county records: 9(1w); 15(4t); 17(1w); 46(2n); 50(5B); 63(4n); 70(1w).

537. *Salda littoralis* (Linnaeus) (Saldidae)




A total of 94 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5B); 7(8h); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 22(1w); 23(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 31(6δ); 32(7r); 33(5B); 34(2l); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 45(2n); 46(2n); 48(1w); 49(1w); 52(4s); 53(3o); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(8n); 64(4n); 65(8n); 66(5r); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 76(7q); 80(5x); 81(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 98(7s); 99(7q); 100(5x); 102(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H15(3e); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H33(5C); H34(3e); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

538. *Salda morio* Zetterstedt (Saldidae)




A total of 34 vice-county records: 41(5B); 42(5B); 43(5B); 44(2n); 46(2n); 47(5B); 48(5B); 49(1w); 50(5B); 57(1w); 59(10d); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 69(5B); 70(1w); 75(5x); 92(5x); 96(5x); 98(5x); 100(5x); 104(5x); 107(5B); 108(5B); 110(5x); H9(3e); H15(5C); H16(3e); H25(3e); H28(3e); H32(5C); H36(5C).

539. *Salda muelleri* (Gmelin) (Saldidae)




A total of 35 vice-county records: 2(4s); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 31(1w); 35(5B); 44(2n); 45(2n); 46(2n); 49(5B); 50(5B); 52(5B); 57(1w); 60(5d); 62(4n); 63(4n); 67(5r); 69(5B); 70(1w); 73(5x); 75(5x); 88(5x); 92(5x); 96(5x); 98(5x); 100(5x); 102(5B); 105(5x); H16(5C); H23(5C); H33(5C); H36(5C); H37(5C); H38(5C); H39(5C).

540. *Saldula arenicola* (Scholtz) (Saldidae)




A total of 11 vice-county records: 3(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 14(7s); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 31(7r); 70(1w); 76(7q).

541. *Saldula c-album* (Fieber) (Saldidae)




A total of 52 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 9(1w); 10(3f); 22(5B); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(5B); 49(4s); 50(1w); 52(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(5B); 70(1w); 72(5x); 73(5B); 75(7q); 77(5B); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 100(5x); 104(5B); 105(5B); 106(5x); 107(5x); 108(5B).

542. *Saldula fucicola* (J. Sahlberg) (Saldidae)




A total of 11 vice-county records: 36(5B); 61(8n); 63(8n); 68(5B); 69(5B); 70(1w); 85(5x); 88(5x); 99(5x); 111(5x); 112(5x).

543. *Saldula melanoscela* (Fieber) (Saldidae)




Only one vice-county record: 70(1w).

544. *Saldula opacula* (Zetterstedt) (Saldidae)




A total of 44 vice-county records: 14(7F); 15(5B); 16(4t); 18(4p); 20(1w); 23(3q); 25(5f); 27(4e); 29(1w); 31(7r); 32(7r); 41(5B); 44(5B); 45(5B); 46(5B); 49(4s); 52(4s); 53(3o); 58(10d); 59(5B); 62(5B); 74(10w); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 107(5x); 108(5B); H1(5C); H3(3e); H9(5C); H12(5C); H15(5C); H16(5C); H17(5C); H21(3e); H25(5C); H32(5C); H33(5C); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(5C); H39(5C); H40(5C).

545. *Saldula orthochila* (Fieber) (Saldidae)




A total of 89 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 7(5j); 8(6u); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(6u); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(4f); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 30(1w); 31(7r); 32(7r); 33(2l); 36(1w); 37(1w); 38(2h); 39(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5r); 66(1w); 67(5r); 70(1w); 72(5x); 77(5x); 84(5B); 85(5x); 88(5x); 89(5B); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 99(7q); 104(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); 112(5x); H6(5C); H9(5C); H10(3e); H12(3e); H15(5C); H16(3e); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H27(3e); H37(3e); H38(5C).

546. *Saldula pallipes* (Fabricius) (Saldidae)




A total of 33 vice-county records: 6(5B); 7(5B); 10(3f); 12(4x); 13(7F); 14(7F); 15(5B); 17(6x); 18(4p); 19(4p); 22(5s); 23(3q); 25(5B); 28(4e); 29(4v); 30(5q); 31(5B); 32(6e); 38(2h); 39(5B); 44(1w); 52(5B); 53(3o); 54(3o); 57(5B); 58(1w); 59(5B); 63(4n); 64(4n); 68(5B); 72(5x); 74(10w); 105(5x).

547. *Saldula palustris* (Douglas) (Saldidae)




A total of 49 vice-county records: 1(2g); 4(10y); 9(3r); 10(3f); 11(3r); 13(5h); 14(7F); 15(5B); 18(4p); 19(4p); 25(5B); 27(4e); 28(4e); 29(7r); 34(5B); 41(5B); 44(2n); 45(2n); 46(2n); 50(5B); 52(5B); 53(8h); 54(3o); 58(1w); 59(5B); 60(5d); 61(4n); 69(5B); 70(1w); 73(5B); 95(5B); 96(5B); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); H1(3e); H3(3e); H9(5C); H12(5C); H16(5C); H21(5C); H27(5C); H28(5C); H35(5C); H38(5C).

548. *Saldula pilosella* (Thomson) (Saldidae)




A total of 25 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 4(10y); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 23(1w); 25(5f); 27(5B); 28(4e); 54(3o); 60(10d); 61(4n); 63(4n); 64(4n); 72(5x); H6(3e); H12(5C).

549. *Saldula saltatoria* (Linnaeus) (Saldidae)




A total of 131 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(10y); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3g); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5B); 76(7q); 77(5B); 80(5x); 81(5x); 82(5B); 83(5B); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(7q); 99(5x); 100(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H8(5C); H9(3e); H11(3e); H12(3e); H13(3e); H15(5C); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(5C); H31(5C); H32(5C); H33(5C); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

550. *Saldula setulosa* (Puton) (Saldidae)




Only one vice-county record: 9(1w).

551. *Teloleuca pellucens* (Fabricius) (Saldidae)




A total of 13 vice-county records: 49(1w); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5r); 66(1w); 67(7x); 69(5B); 70(1w); 83(5x); 88(5x); 96(5x); 108(5B).

552. *Aepophilus bonnairei* Signoret (Aepophilidae)




A total of 19 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 9(1w); 10(3f); 41(1w); 45(1w); 49(1w); 52(1w); 71(5d); H3(3e); H6(3e); H9(5C); H15(3e); H16(5C); H21(3e); H27(3e); H28(5C).

553. *Mesovelia furcata* Mulsant & Rey (Mesoveliidae)




A total of 45 vice-county records: 3(5o); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 35(1w); 37(5B); 39(1w); 40(5B); 42(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(10d); 61(4n); 62(8n); 63(4n); 64(8n); 83(5B); H1(3e).

554. *Hebrus pusillus* (Fallén) (Hebridae)




A total of 22 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(4v); 38(1w); 41(5B); 49(1w); 52(1w); H6(5C).

555. *Hebrus ruficeps* Thomson (Hebridae)




A total of 89 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 6(5B); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(7F); 14(5B); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(5B); 35(5B); 36(1w); 38(3p); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(5B); 55(5B); 57(5B); 58(1w); 59(10d); 61(4n); 62(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 88(5x); 89(5x); 102(5x); 106(5x); H1(5C); H2(3e); H3(5C); H9(3e); H11(5C); H14(3e); H15(5C); H18(5C); H19(5C); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H25(5C); H27(5C); H29(5C); H32(3e); H33(3e); H34(5C); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H38(3e).

556. *Hydrometra gracilenta* Horváth (Hydrometridae)




A total of 7 vice-county records: 11(3f); 14(5h); 27(4e); 33(5B); 40(5B); 60(5B); H3(3e).

557. *Hydrometra stagnorum* (Linnaeus) (Hydrometridae)




A total of 118 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5B); 68(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 85(5x); 87(5x); 88(5x); 90(5x); 95(5x); 98(5B); 100(5x); 101(5x); 103(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H10(5C); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H16(5C); H17(5C); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

558. *Microvelia buenoi* Drake (Veliidae)




A total of 3 vice-county records: 27(4e); 28(4e); 29(1w).

559. *Microvelia pygmaea* (Dufour) (Veliidae)




A total of 34 vice-county records: 1(2g); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(5B); 24(5B); 25(5f); 26(5B); 27(5B); 29(1w); 30(1w); 31(7r); 32(6e); 37(5B); 41(1w); 58(1w); 63(8n); 64(8n); H1(3e); H3(3e); H5(3e); H8(3e); H9(3e).

560. *Microvelia reticulata* (Burmeister) (Veliidae)




A total of 122 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5B); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5B); 98(5x); 99(5B); 100(5x); 106(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(5C); H6(5C); H8(5C); H9(3e); H10(5C); H12(3e); H15(3e); H16(5C); H19(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H35(5C); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

561. *Velia caprai* Tamanini (Veliidae)




A total of 139 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H6(5C); H9(3e); H10(5C); H16(5C); H18(5C); H19(5C); H20(5C); H21(5C); H25(5C); H26(5C); H27(5C); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

562. *Velia saulii* Tamanini (Veliidae)




A total of 77 vice-county records: 3(5B); 5(5I); 9(1w); 11(3f); 14(7F); 17(4f); 19(4p); 20(1w); 30(1w); 31(7r); 32(1w); 39(1w); 43(1w); 44(1w); 48(1w); 49(1w); 51(1w); 53(3o); 55(5B); 57(1w); 58(1w); 60(5d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 77(5x); 78(13g); 79(5x); 80(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 93(5B); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 101(5x); 102(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H16(5C); H17(5C); H20(3e); H23(3e); H25(5C); H26(5C); H27(5C); H28(5C); H30(5C); H33(5C); H36(5C); H37(3e); H39(5C); H40(5C).

563. *Aquarius najas* (De Geer) (Gerridae)




A total of 76 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5f); 29(1w); 30(1w); 32(1w); 34(5B); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(6F); 53(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 108(5B); 109(5B); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H7(5C); H9(3e); H10(5C); H11(5C); H12(3e); H13(5C); H15(3e); H20(3e); H30(5C); H33(5C); H36(3e); H37(3e); H38(3e).

564. *Aquarius paludum* (Fabricius) (Gerridae)




A total of 32 vice-county records: 6(5v); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 19(5B); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(5B); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(6e); 37(6θ); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 50(1w); 53(6e); 57(1w); 66(1w).

565. *Gerris argentatus* Schummel (Gerridae)




A total of 79 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5l); 7(5B); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(5B); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 42(1w); 44(1w); 45(5B); 51(1w); 53(3o); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 69(1w); H1(3e); H2(5C); H3(5C); H6(5C); H8(3e); H9(3e); H12(5C); H15(5C); H16(3e); H18(5C); H19(5C); H21(3e); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(5C); H28(5C); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H35(5C); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(5C); H40(5C).

566. *Gerris costae* (Herrich-Schaeffer) (Gerridae)




A total of 69 vice-county records: 17(1w); 39(1w); 45(1w); 46(1w); 49(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 77(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5B); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); H6(5C); H9(3e); H16(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H28(3e); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

567. *Gerris gibbifer* Schummel (Gerridae)




A total of 67 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 28(5B); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 34(2l); 35(1w); 36(5B); 37(60); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(6f); 52(1w); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 81(5x); 82(5B); 88(5x); 96(5x).

568. *Gerris lacustris* (Linnaeus) (Gerridae)




A total of 143 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5B); 110(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(5C); H8(3e); H9(3e); H10(5C); H12(5C); H14(5C); H15(5C); H16(5C); H18(5C); H19(3e); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

569. *Gerris lateralis* Schummel (Gerridae)




A total of 87 vice-county records: 3(5o); 8(5j); 9(3q); 11(3f); 13(7F); 14(5B); 15(5B); 17(1w); 19(4p); 20(5B); 22(1w); 23(1w); 25(5B); 26(5B); 27(5B); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 35(1w); 36(5B); 37(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(5B); 54(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(7s); 69(1w); 70(1w); 71(5B); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 77(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 85(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 95(5x); 96(5x); 99(5x); 103(5x); 104(5x); 107(5x); 109(5B); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H2(5C); H9(5C); H11(5C); H18(5C); H19(5C); H21(3e); H26(5C); H27(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(5C).

570. *Gerris odontogaster* (Zetterstedt) (Gerridae)




A total of 129 vice-county records: 1(2g); 3(5B); 5(5I); 6(5I); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 34(2I); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(5C); H9(3e); H10(5C); H12(5C); H15(3e); H16(5C); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H35(5C); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

571. *Gerris thoracicus* Schummel (Gerridae)




A total of 129 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 42(1w); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 88(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H9(3e); H12(3e); H15(5C); H16(5C); H17(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(5C); H30(5C); H31(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(5C); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

572. *Limnoporus rufoscutellatus* (Latreille) (Gerridae)




A total of 25 vice-county records: 14(5h); 16(4t); 17(1w); 25(5f); 27(5f); 28(4e); 56(5B); 67(5r); 70(1w); H1(5C); H2(3e); H5(5C); H9(3e); H15(5C); H16(5C); H18(3e); H23(5C); H25(3e); H33(3e); H34(5C); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(5C); H39(3e).

573. *Nepa cinerea* Linnaeus (Nepidae)




A total of 142 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5B); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5B); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5B); 109(5x); 110(5x); 111(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H6(5C); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H10(5C); H11(3e); H12(5C); H13(5C); H15(5C); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(5C); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5B).

574. *Ranatra linearis* (Linnaeus) (Nepidae)




A total of 64 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(5B); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 48(1w); 49(4s); 50(1w); 51(1w); 52(4s); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 67(10w); 70(10w); 73(10w); 74(10w); H12(10d).

575. *Ilyocoris cimicoides* (Linnaeus) (Naucoridae)




A total of 66 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 42(1w); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 47(1w); 50(5B); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5B); 66(1w); 67(5r); 69(5B); 77(7q).

576. *Naucoris maculatus* Fabricius (Naucoridae)




A total of 2 vice-county records: 15(4t); 16(4t).

577. *Aphelocheirus aestivalis* (Fabricius) (Aphelocheiridae)




A total of 100 vice-county records: 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(5B); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(5B); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 46(1w); 47(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 61(4n); 62(4n); 64(4n); 68(5r); 70(1w); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 81(5x); 86(5B); 87(5x); 89(5x); 97(5B); 107(5B); 108(5B); 109(5B); H1(5C); H2(5C); H3(5C); H4(5C); H6(5C); H7(3e); H8(5C); H9(3e); H10(5C); H11(5C); H12(5C); H13(5C); H14(3e); H15(5C); H16(5C); H17(5C); H18(5C); H19(3e); H21(3e); H22(3e); H23(5C); H24(5C); H25(5C); H26(3e); H27(5C); H28(5C); H29(5C); H30(5C); H34(5C); H35(5C); H36(5C); H37(3e); H39(3e).

578. *Notonecta glauca* Linnaeus (Notonectidae)




A total of 148 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(5C); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H10(5C); H11(3e); H12(3e); H14(3e); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

579. *Notonecta maculata* Fabricius (Notonectidae)




A total of 68 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5B); 6(5l); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(5B); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(5B); 46(1w); 47(1w); 49(1w); 50(1w); 52(4s); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5B); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 70(1w); 74(5B); H21(10d); H30(3e).

580. *Notonecta obliqua* Thunberg (Notonectidae)




A total of 106 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(2h); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(5B); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 76(5x); 88(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5B); 110(5x); 111(5B); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H9(3e); H12(3e); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(5C); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

581. *Notonecta viridis* Delcourt (Notonectidae)




A total of 72 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(7s); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(5B); 66(1w); 71(5d); 74(10w); H2(3e); H3(3e); H5(5C); H6(5C); H9(5C); H12(3e); H15(10d); H39(5C).

582. *Plea minutissima* Leach (Pleidae)




A total of 86 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(5B); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 73(5x); 74(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(3e); H5(3e); H6(3e); H12(3e); H16(3e); H20(3e); H22(5C); H28(3e); H32(5C); H38(3e); H40(3e).

583. *Arctocoris carinata* (C.R. Sahlberg) (Corixidae)




A total of 39 vice-county records: 6(5l); 16(5B); 17(1w); 39(1w); 41(1w); 54(3o); 57(1w); 59(5d); 61(8n); 63(8n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 88(5x); 90(5x); 92(5B); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 100(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H16(3e); H20(3e); H28(3e); H35(3e).

584. *Arctocoris germari* (Fieber) (Corixidae)




A total of 111 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 6(5B); 9(1w); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 17(1w); 18(4p); 19(5B); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(6δ); 32(1w); 36(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 45(1w); 46(2n); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 95(5x); 96(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5B); 102(5x); 104(5x); 106(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H4(5C); H9(3e); H10(3e); H11(5C); H15(3e); H16(3e); H18(5C); H21(3e); H22(5C); H24(5C); H25(5C); H26(3e); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(3e); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

585. *Callicorixa praeusta* (Fieber) (Corixidae)




A total of 144 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(1w); 44(5B); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(5C); H8(5C); H9(3e); H10(3e); H11(5C); H12(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(3e); H24(5C); H25(3e); H26(5C); H27(5C); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

586. *Callicorixa wollastoni* (Douglas & Scott) (Corixidae)




A total of 72 vice-county records: 3(5o); 4(10y); 11(3r); 20(1w); 39(1w); 40(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(5B); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 75(5x); 77(5x); 78(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H6(5C); H9(5C); H16(3e); H20(3e); H27(3e); H28(3e); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

587. *Corixa affinis* Leach (Corixidae)




A total of 44 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5B); 6(5I); 10(3f); 11(3f); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 22(1w); 25(5f); 27(5B); 28(4e); 29(1w); 32(6e); 34(5B); 35(1w); 41(5B); 45(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 56(5B); 61(4n); 64(4n); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H9(3e); H12(5C); H15(3e); H16(5C); H21(3e); H23(3e); H28(5C); H34(3e); H38(5C); H40(3e).

588. *Corixa dentipes* Thomson (Corixidae)




A total of 101 vice-county records: 6(5B); 7(5j); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 12(3f); 13(5h); 14(7F); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 35(5B); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(5B); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 48(1w); 49(1w); 51(5B); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5B); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 80(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 101(5x); 110(5x); H1(5C); H2(3e); H3(3e); H9(5C); H12(5C); H15(5C); H16(3e); H21(3e); H22(5C); H25(5C); H26(5C); H28(5C); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(5C); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

589. *Corixa iberica* Jansson (Corixidae)




A total of 12 vice-county records: 98(5x); 100(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 107(5x); 108(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H39(3e).

590. *Corixa panzeri* Fieber (Corixidae)




A total of 100 vice-county records: 1(2g); 5(5l); 6(5l); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(4x); 12(3f); 13(6t); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 41(1w); 44(2n); 45(5B); 46(1w); 47(1w); 49(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 77(5x); 82(5x); 83(5x); 85(5B); 89(5B); 92(5x); 93(5x); 95(5x); 100(5x); 103(5x); 104(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H8(5C); H9(3e); H10(3e); H12(3e); H15(3e); H16(3e); H18(5C); H21(3e); H22(5C); H27(5C); H28(3e); H32(5C); H33(5C); H34(5C); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(5C); H40(3e).

591. *Corixa punctata* (Illiger) (Corixidae)




A total of 138 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(5C); H8(5C); H9(3e); H11(5C); H12(5C); H14(3e); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H25(3e); H26(5C); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

592. *Cymatia bonstdorffii* (C.R. Sahlberg) (Corixidae)




A total of 119 vice-county records: 2(2g); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(4x); 14(5h); 15(4t); 16(5B); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5B); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(5B); 32(1w); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 43(1w); 44(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 51(1w); 52(6F); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5r); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5B); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H10(3e); H14(5C); H15(3e); H16(3e); H18(5C); H19(3e); H21(3e); H23(3e); H25(3e); H26(3e); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

593. *Cymatia coleoptrata* (Fabricius) (Corixidae)




A total of 56 vice-county records: 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 50(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 61(4n); 62(5B); 63(4n); 64(4n); 66(5B); 103(5x); 110(5x).

594. *Cymatia rogenhoferi* (Fieber) (Corixidae)




A total of 4 vice-county records: 14(5h); 18(4p); 30(1w); 31(7r).

595. *Glaenocoris cavifrons* (Thomson) (Corixidae)




A total of 6 vice-county records: 29(1w); 58(1w); 59(5d); 69(1w); 70(1w); 102(5x).

596. *Glaenocoris propinqua* (Fieber) (Corixidae)




A total of 19 vice-county records: 6(5l); 27(4e); 49(1w); 58(1w); 64(4n); 66(1w); 69(1w); 70(1w); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H9(3e); H16(3e); H20(3e); H33(3e); H34(3e); H36(3e); H38(3e); H39(3e).

597. *Hesperocorixa castanea* (Thomson) (Corixidae)




A total of 110 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 6(5l); 8(5j); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(5B); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 26(5B); 32(1w); 34(2l); 35(1w); 37(5B); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 57(1w); 58(1w); 59(5B); 61(6y); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(5C); H9(3e); H11(5C); H16(3e); H18(5C); H20(3e); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

598. *Hesperocorixa linnaei* (Fieber) (Corixidae)




A total of 125 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(3p); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 82(5x); 83(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 106(5x); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(5C); H8(3e); H9(3e); H10(5C); H11(5C); H12(3e); H15(5C); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H23(5C); H25(5C); H26(3e); H27(5C); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

599. *Hesperocorixa moesta* (Fieber) (Corixidae)




A total of 66 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 5(5B); 6(5l); 7(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 35(5B); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(5B); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(5B); 58(1w); 59(5d); 60(10d); 61(5B); 62(4n); 66(1w); 69(1w); 71(5d); H1(3e); H2(3e); H8(3e); H9(3e); H11(5C); H21(3e); H34(3e); H38(3e); H39(5C); H40(3e).

600. *Hesperocorixa sahlbergi* (Fieber) (Corixidae)




A total of 139 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(5C); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H11(5C); H12(3e); H17(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H30(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

601. *Micronecta griseola* Horváth (Corixidae)




A total of 8 vice-county records: 12(3f); 17(1w); 22(1w); 23(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); H9(3e).

602. *Micronecta minutissima* (Linnaeus) (Corixidae)




A total of 16 vice-county records: 12(3f); 14(5B); 15(5B); 17(1w); 19(4p); 20(1w); 22(1w); 23(1w); 25(5f); 27(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 56(1w); 70(1w); 110(5x).

603. *Micronecta poweri* (Douglas & Scott) (Corixidae)




A total of 100 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 4(5o); 5(5B); 7(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(5B); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(3o); 54(5B); 56(5B); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 60(10d); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(5B); 67(5B); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5B); 85(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 92(5x); 94(5x); 95(5x); 98(5x); 99(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 107(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); H1(3e); H2(3e); H6(3e); H9(5C); H15(3e); H16(3e); H20(5C); H21(3e); H23(5C); H25(5C); H26(5C); H27(5C); H28(3e); H30(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H39(3e); H40(3e).

604. *Micronecta scholtzi* (Fieber) (Corixidae)




A total of 46 vice-county records: 3(5o); 5(5B); 6(5l); 7(5B); 8(5B); 10(3f); 11(3r); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(5B); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 34(2l); 35(1w); 37(60); 38(1w); 40(5B); 42(1w); 45(1w); 53(3o); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(10d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w).

605. *Paracorixa concinna* (Fieber) (Corixidae)




A total of 107 vice-county records: 1(2g); 3(10y); 5(5l); 6(5B); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5B); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 34(5B); 35(1w); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 87(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 102(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(5C); H6(3e); H9(3e); H12(5C); H15(3e); H20(5C); H22(5C); H29(5C); H30(5C); H32(5C); H34(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

606. *Sigara distincta* (Fieber) (Corixidae)




A total of 142 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5B); 6(5l); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H6(5C); H7(3e); H8(5C); H9(3e); H10(3e); H14(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H20(5C); H21(3e); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H26(3e); H27(3e); H28(3e); H29(3e); H30(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

607. *Sigara dorsalis* (Leach) (Corixidae)




A total of 147 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H4(5C); H5(3e); H6(5C); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H10(3e); H12(3e); H14(3e); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

608. *Sigara falleni* (Fieber) (Corixidae)




A total of 136 vice-county records: 1(2g); 2(5B); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(5B); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 95(5x); 96(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 106(5x); 107(5x); 109(5B); 111(5x); H1(5C); H2(3e); H4(5C); H7(3e); H8(3e); H9(3e); H12(3e); H14(3e); H16(3e); H18(5C); H19(3e); H20(5C); H21(3e); H22(3e); H23(3e); H24(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

609. *Sigara fallenoidea* (Hungerford) (Corixidae)




A total of 17 vice-county records: H9(3e); H10(3e); H15(3e); H16(5C); H17(5C); H23(5C); H24(5C); H25(3e); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(5C); H33(3e); H35(5C); H37(3e); H39(3e); H40(3e).

610. *Sigara fossarum* (Leach) (Corixidae)




A total of 123 vice-county records: 1(2g); 2(5B); 3(5o); 5(5B); 6(5l); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 45(1w); 48(1w); 49(1w); 50(5B); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(5B); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5B); 92(5x); 96(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 109(5x); 110(5x); H1(5C); H2(3e); H6(3e); H9(3e); H10(3e); H12(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(3e); H20(3e); H21(3e); H23(3e); H25(5C); H26(3e); H27(3e); H28(3e); H29(5C); H30(3e); H32(5C); H33(3e); H34(3e); H35(5C); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

611. *Sigara iactans* Jansson (Corixidae)




A total of 18 vice-county records: 14(5h); 15(4t); 17(10d); 18(4p); 19(4p); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 32(1w); 36(12p); 49(12p); 52(12p); 53(3o); 57(5B); 58(12p).

612. *Sigara lateralis* (Leach) (Corixidae)




A total of 121 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5l); 7(5B); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(5B); 43(5B); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 47(5B); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 79(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 109(5B); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(5C); H5(3e); H6(3e); H9(3e); H11(5C); H12(5C); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H20(5C); H21(3e); H26(5C); H30(5C); H34(3e); H37(5C); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

613. *Sigara limitata* (Fieber) (Corixidae)




A total of 69 vice-county records: 1(2g); 4(5o); 6(5B); 8(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(5B); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 36(1w); 37(5B); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 44(5B); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(5B); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5B); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 96(5x); H2(3e); H26(5C); H34(3e); H38(3e).

614. *Sigara longipalis* (J. Sahlberg) (Corixidae)




Only one vice-county record: 27(4e).

615. *Sigara nigrolineata* (Fieber) (Corixidae)




A total of 136 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5l); 6(5B); 7(5j); 8(5j); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 31(1w); 32(1w); 33(2l); 34(2l); 35(1w); 36(1w); 37(1w); 38(1w); 39(1w); 40(1w); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(1w); 45(1w); 46(2n); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 80(5x); 81(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5B); 98(5B); 99(5B); 100(5B); 102(5x); 103(5B); 104(5x); 105(5x); 106(5B); 107(5B); 108(5B); 109(5B); 110(5x); 111(5B); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H6(3e); H8(3e); H9(3e); H10(3e); H12(3e); H15(3e); H16(3e); H20(3e); H21(3e); H22(5C); H23(3e); H24(5C); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H30(3e); H31(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(3e).

616. *Sigara scotti* (Douglas & Scott) (Corixidae)




A total of 106 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5o); 5(5B); 9(1w); 11(3f); 12(3f); 13(7F); 14(5h); 17(1w); 20(1w); 21(4f); 22(1w); 23(1w); 24(1w); 30(5q); 31(1w); 35(5B); 37(5B); 39(5B); 40(5B); 41(1w); 42(1w); 43(1w); 44(5B); 45(2n); 46(1w); 47(1w); 48(1w); 49(1w); 51(1w); 52(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 61(8n); 62(4n); 63(4n); 64(5B); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H8(3e); H9(3e); H10(3e); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H19(5C); H21(5C); H25(5C); H26(5C); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H36(3e); H37(3e); H38(3e); H39(3e); H40(5C).

617. *Sigara selecta* (Fieber) (Corixidae)




A total of 24 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 9(1w); 11(4x); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 18(4p); 19(4p); 25(5f); 26(5f); 27(5B); 29(1w); 41(5B); 54(3o); 56(5B); 61(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); H1(3e); H9(5C); H16(3e).

618. *Sigara semistriata* (Fieber) (Corixidae)




A total of 103 vice-county records: 3(5o); 5(5B); 6(5I); 9(1w); 10(3f); 12(5B); 13(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 21(1w); 23(1w); 25(5f); 26(5B); 27(4e); 29(1w); 31(6δ); 36(1w); 40(1w); 41(5B); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(6f); 52(1w); 54(3o); 55(1w); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(5B); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 68(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 76(5x); 77(5x); 78(5x); 79(5x); 80(5x); 82(5x); 83(5x); 84(5x); 85(5x); 86(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 91(5x); 92(5x); 93(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 106(5x); 107(5x); 108(5x); 109(5x); 110(5x); H1(3e); H2(3e); H3(3e); H5(3e); H9(3e); H12(3e); H15(3e); H16(3e); H17(3e); H18(5C); H20(3e); H21(3e); H25(3e); H27(3e); H28(5C); H29(5C); H33(3e); H34(3e); H35(3e); H37(3e); H38(5C); H39(3e); H40(3e).

619. *Sigara stagnalis* (Leach) (Corixidae)




A total of 61 vice-county records: 1(2g); 3(5o); 5(5l); 6(5l); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 13(5h); 14(5h); 15(4t); 16(4t); 17(1w); 18(4p); 19(4p); 20(1w); 21(1w); 23(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 34(2l); 35(1w); 38(1w); 39(1w); 41(1w); 44(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 51(1w); 52(1w); 53(3o); 54(3o); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 74(5x); H1(3e); H3(3e); H5(3e); H6(3e); H9(5C); H12(3e); H15(3e); H16(5C); H20(5C); H21(3e); H27(5C); H28(5C); H34(3e); H38(3e).

620. *Sigara striata* (Linnaeus) (Corixidae)



A total of 8 vice-county records: 13(7F); 14(5h); 15(4t); 16(5B); 18(4p); 27(4e); 54(3o); 55(5B).

621. *Sigara venusta* (Douglas & Scott) (Corixidae)



A total of 89 vice-county records: 1(2g); 2(2g); 3(5o); 4(5B); 5(5l); 6(5B); 9(1w); 10(3f); 11(3f); 12(3f); 13(7F); 14(5h); 15(4t); 17(1w); 20(1w); 25(5f); 26(5f); 27(4e); 28(4e); 29(1w); 30(1w); 40(5B); 41(1w); 44(1w); 45(1w); 46(1w); 48(1w); 49(1w); 50(1w); 52(1w); 53(5B); 54(3o); 56(1w); 57(1w); 58(1w); 59(5d); 60(5d); 61(4n); 62(4n); 63(4n); 64(4n); 65(4n); 66(1w); 67(5r); 69(1w); 70(1w); 71(5d); 72(5x); 73(5x); 74(5x); 75(5x); 77(5x); 79(5x); 83(5x); 85(5x); 87(5x); 88(5x); 89(5x); 90(5x); 92(5x); 93(5x); 94(5x); 95(5x); 96(5x); 97(5x); 98(5x); 99(5x); 100(5x); 101(5x); 102(5x); 103(5x); 104(5x); 105(5x); 107(5B); 108(5x); 109(5x); 110(5x); 111(5x); 112(5x); H1(3e); H2(3e); H17(3e); H20(3e); H27(5C); H34(3e); H35(3e); H37(3e); H38(3e); H40(3e).